

*Formica (Serviformica) subrufa* Rog.

Sierra de Guadarrama.—Fortuna.—Cabacés 2, VII, 18 ♂, ♀. Ce ♂ décrit avec doute par Emery, appartient bien, comme il le supposait, à *subrufa*.

*Formica (Serviformica) fusca* L.

Gijón.—Sahún.—Covadonga.—Sierra de Guadarrama, ces derniers, font passage à la var. *Lemani* Bond.

*Formica (Serviformica) fusca* st. *glebaria* Nyl.

Sierra de Guadarrama.—Sierra Nevada.—Gijón. Benasque.—Tiermas.—Tarragona.—Gilbat.

*Formica (Serviformica) fusca* st. *glebaria* v. *pyrenaica* Bond.

Sierra de Guadarrama.—El Pardo.—Benasque.—Viladrau.—S. Juan Abadesas (6).

*Formica (Serviformica) fusca* st. *glebaria* v. *rubescens* For.

Gijón.—Sierra Nevada.—Tiermas.—Benasque.

*Formica (Serviformica) fusca* st. *glebaria* v. *decepiens* Bond.

Sahún.—(H.) 9, VII, 30. 1 ♀, ♀.—Balenyá (B.) 27, VII, 28 1 ♀.

*Formica (Proformica) nasuta* Nyl.

Vaciamadrid.

*Formica (Proformica) nasuta* v. *depilis* Sants.

Zamora.—Sierra de Guadarrama.

*Cataglyphis (Monocombus) viatica* F.

Puerto de Santa María.

*Cataglyphis (Monocombus) viatica* v. *velox* Sants.

Sevilla.—Chez cette variété les grandes ouvrières ont les pattes plus claires que chez le type.

*Cataglyphis (Monocombus) hispanica* For.

Mérida. Exemplaires foncés passant à la variété *nigroides* Sants.

*Cataglyphis (Monocombus) cursor* Fonsc. st. *pilicornis* Forel, v. *tibialis* Bond.

Salamanca. 2 ♀. Cette variété se distingue de *pilicornis*