

que noire et une sculpture plus accusée faisant passage à la var. *barcinensis* Menozzi.

Aphaenogaster (Attomyrma) gibbosa Latr. *italica* (Emery)
= *A. (Att.) gibbosa strioloides* v. *italica* Emery 1916 (1915)
p. 130, 134, 139.

Cette forme est assez distincte de *strioloides* pour mériter au moins le rang de sousespèce. (Fig. 3 et 4).

♀. Long: 5 — 5,6 mm. Noir brunâtre. Mandibules, funicule et tarses rouge brunâtre; reste des appendices bruns. Beaucoup plus sculptée que le type. La fine réticulation ponctuée du fond s'étend sur le devant de la tête et l'occiput. Thorax entièrement sculpté, seul le devant du mésonotum est plus luisant et faiblement chagriné. Côtés du thorax plutôt poncturéticulé, côtés du pédoncule finement ponctués, le reste lisse et luisant, sans strie à la base du gastre. Diffère en outre du type par la tête un peu plus étroite. Les articles moyens du funicule pas plus de deux fois plus longs qu'épais. Le mésonotum surmonte nettement le pronotum. Epine plus fines et plus relevées. Post-pétiole plus grand, deux fois plus large que le pétiole (de la moitié chez le type).

♀. Long: 7,5 mm Diffère de *gibbosa* type par les mêmes caractères que l'ouvrière. Centre des mésonotum et scutellum lisse, le reste assez sculpté. Epines plus courtes et plus droites.

♂. Long: 4 — 4,3 mm. Noirâtre. Mandibules, massue des antennes, tibias et tarses roussâtres. Tête plus fortement ponctuée, mate. Mésonotum, scutellum et côtés du thorax en grande partie chagrinés réticulés et submats. Le reste lisse et luisant. Tête un peu plus large que longue, plus arrondie derrière que chez le type. Les yeux en occupent près des $\frac{2}{3}$ des côtés. Ocelles un peu plus espacés. Scape plus long et plus mince. Mésonotum plus long et moins haut, presque sur le même plan que le scutellum. Étranglement de l'épinotum un peu plus accusé. Post-pétiole bien plus large, surtout derrière, cupuliforme.

Italie: Ligurie. (Cotypes communiqués par Mr. Menozzi).

Aphaenogaster (Attomyrma) gibbosa st. *strioloides* (Forel)
Emery 1908 p. 335.

= *A. subterranea* v. *strioloides* Forel 1890 p. 71. (Fig. 1 et 2).

♀. Long: 4 mm. Peu variable de taille. Thorax d'un roux plus ou moins brunâtre, la tête plus foncée. Une large bande brune sur le premier tergite du gastre et qui peut s'étendre à tout le gastre. Celui-ci lisse avec de brèves stries à la base; le reste du