

corps densément réticulé ponctué mat, à peine plus luisant sur le pronotum. Un réseau de rides moins nettement longitudinales que chez le type s'étend sur la tête et le thorax.

Tête allongée, aussi rétrécie derrière que devant. Le scape dépasse d'environ un quart le bord basal. Articles du funicule plus courts que chez *gibbosa*, les 3 à 5 environ $1\frac{1}{2}$ à $1\frac{2}{3}$ plus longs qu'épais. Profil du promésonotum comme chez le type. Epines épinoles un peu plus faibles mais plus développées que chez *nadigi* Sants. Postpétiole plus large que chez *gibbosa* mais moins que chez *italica*.

♀. Décrite par Emery, je ne la connais pas en nature.

♂. (Non décrit) Long: 3,5 mm. (tête fléchie). D'un brun jaunâtre clair; tête et gastre plus foncés; pattes plus claires. Sauf quelques poils courts sur l'angle de l'épinotum, le thorax est presque glabre; gastre assez pileux. Tête finement et assez faiblement réticulée ponctué, peu luisante; le reste du corps lisse et luisant. Ailes jaunâtres; les nervures et taches jaune rousâtre.

Tête rectangulaire (Fig. 2) un peu plus large que chez *gibbosa*. Les yeux plus grands. Ocelles distants d'une fois et demi leur diamètre. Scape court; les articles 4 et 5 du funicule de $\frac{2}{3}$ à $\frac{1}{2}$ plus longs qu'épais. Pronotum aussi élevé que chez le type. Epinotum plus allongé dans sa partie horizontale, l'angle tuberculé. Postpédicelle aussi haut que long.

Algérie: Souk Aras (Forel) types ♀ reçus de Forel. — Tunisie: Aïn Drahem (Santschi 1913) — Le Kef ♀, ♂ (♂ type) Dr. Normand. — Kairouan (Santschi, 24 VII 1911. ♂ à la lumière. Variété à yeux plus petits. Je n'ai jamais vu les ♀ dans cette localité.

Aphaenogaster (Attomyrma) gibbosa st. *mauritanica* (Emery) = *A. (Att.) gibbosa* v. *mauritanica* Emery 1908 p. 334 ♀. — 1922 p. 59; — Santschi 1911 p. 284. ♂. (Fig. 5 et 6).

= *A. striata* v. *mauritanica* Emery 1891 p. 8.

♀. Long: 4,7 à 6,4 mm. Brun foncé ou noire. Mandibules, funicules et tarses d'un brun plus ou moins rousâtre; reste des appendices brunâtres. Tête plus densément réticuloponctué et ridée que chez le type. Le thorax, sauf la face déclive de l'épinotum, est entièrement sculpté et mat. Mésonotum en général moins ridé que le reste du thorax. Dessus des noeuds et gastre lisses, luisants, la base du gastre à peine striée.

Tête en général moins large que chez *gibbosa*, antennes un peu plus longues. Les épines plus courtes et plus aiguës. Postpétiole plus large que chez le type mais moins que chez *italica*.