

*Aphaenogaster (Attomyrma) gibbosa* st. *fiori* Emery 1915 p. 258. — 1916 p. 130, 134

Cette race est très aberrante et je doute qu'elle puisse rester unie à *gibbosa*. La découverte des sexués, surtout du mâle, tranchera la question. Outre sa couleur roussâtre qui rappelle *splendida*, l'ouvrière a une sculpture bien plus faible que chez *gibbosa*, l'épistome et l'aire frontale lisses, les articles 2 à 6 du funicule aussi courts que chez *strioloides*. La tête est plus étroite devant que derrière avec les côtés plus arqués et le bord basal convexe. Yeux plus petits. Profil du mésonotum plus régulièrement oblique, faisant une ligne presque droite jusqu'à la base de l'épinotum. Epines assez relevées, moins larges et un peu plus longues que chez *gibbosa*. Le postpétiole plus étroit, à peine plus large que le pétiole.

D'après un cotype de la collection Emery communiqué par Mr. Menozzi.

## II.

### Groupe *pallida* Nyl.

*Aphaenogaster (Attomyrma) pallida* Nyl. st. *subterraneoides* Emery 1881 p. 534. — 1916 p. 258. — Finzi 1930 p. 153.

= *A. pallida cypriotes* Emery 1908 p. 329. (Fig. 12).

L'♂ est brunâtre, plus foncée que le type *pallida*, les yeux plus petits. Le scape dépasse le bord basal de la longueur des deux articles suivants. L'épinotum denticulé, sa face basale un peu convexe sur le profil. Le postpétiole plus haut que long et plus haut que chez le type. Les ♂ ♀ inconnus. D'après deux cotypes de la collection Emery communiqués par Mr. Menozzi.

*Aphaenogaster (Attomyrma) pallida* st. *subterraneoides* v. *dulcineae* Santschi 1919 p. 245 ♀. ♂. — Finzi 1930 p. 154. (Omis dans le catal. Gen. Insect. Emery 1922).

= *A. subterraneoides* Bondroit 1918 p. 156, 159. (Fig. 11).

L'♂ diffère de *subterraneoides* non seulement par sa couleur plus claire jaune terne et ses dents épinoles plus longues comme le remarque Finzi, mais encore par ses yeux plus petits, le scape ne dépassant guère le bord basal de plus de la longueur du premier article suivant, et le postpétiole moins élevé.

♀. V. (non encore décrite) (Fig. 10). Long: 7,8 à 8 mm. D'un roux un peu brunâtre, tête et dessus du thorax brunâtres. Tête ridée rugueuse devant, plus ou moins lisse vers le vertex et la face occipitale. Mésosternum réticuléridé, le reste lisse et luisant. Pilosité fine, relevée, plus rare sur le thorax que sur le