

gastre. Tête un peu plus large que longue. Le scape dépasse d'environ son épaisseur le bord basal. Articles 2 à 4 du funicule aussi courts qu'épais. Aire frontale luisante, peu striée. Une gouttière au milieu de l'épistome. Mandibules striées, de 7 à 8 dents. Le mésonotum ne dépasse pas le pronotum (un peu chez *pallida*). Epinotum abrupt; presque vertical, armé d'une épine fine, horizontale.

♂. Long: 3,6 mm. (Fig. 16). Noirâtre, appendices bruns, massue des antennes et tarses roux clair. Lisse et luisant. Pilosité dressée clairsemée, plus riche sur le gastre. Tête rectangulaire, un peu plus longue que large. Ocelles espacés comme environ le double de leur diamètre. Mandibules de 5 dents, l'apicale moins longue que chez *pallida*. Le scape n'atteint pas tout à fait l'ocelle médian. Pronotum plus court et plus haut. Epinotum aussi allongé que chez *pallida* mais les angles relevés en tubercules triangulaires. Noeud du pétiole très bas.

Espagne: Pozuelo de Calatrava (localité type) ♀, ♀, ♂. (de la Fuente).

France: Var: Hyères (Bondroit). St. Tropez (Parker) ♀.

Italie: Bordighera ♀ (Donisthorpe).

Cette variété ressemble beaucoup à *A. (A.) subterranea* Latr. avec laquelle elle peut être confondue. On évitera cette erreur en examinant les ocelles toujours plus grands et plus rapprochés chez cette espèce (Fig. 9) que chez *pallida*. En outre son thorax est plus allongé. (Fig. 15).

### Bibliographie.

- Bondroit* 1918 Fourmis de France et de Belgique. Ann. Soc. Ent. France LXXXVII p. 1 à 173.
- Emery* 1881 Viaggio ad Assab: Formiche. — Ann. Mus. Sc. Nat. Genova XVI p. 523 à 535.
- 1908 Beiträge zur Monographie der Formiciden des paläarktischen Faunagebietes: *Aphaenogaster*. Deutsch. Ent. Zeitschr. XX p. 305 — 338.
- 1915 Contributo alla conoscenza delle Formiche delle isole italiane. — Ann. Mus. St. Nat. Genova, VI (XLVI) p. 244—270.
- 1916 Fauna entomologica italiana: Formicidae. — Bull. Soc. Ent. Ital. XLVII p. 75—275.
- 1922 Genera Insectorum. *Myrmicinae*.