

Quelques fourmis inédites de l'Amérique centrale et Cuba

par le Dr. F. SANTSCHI, Kairouan, Tunisie

(Avec 2 figures dans le texte)

Cylindromyrmex parallelus, n. sp. (fig. 1)

♀. Long: 9mm. Noire. Antennes, cuisses et pygidium d'un brun rougeâtre. Tibias et tarses jaune brunâtre. Tête, thorax abdomen striés en long sauf le cinquième tergite abdominal (qui n'est que faiblement strié au milieu), la base articulaire des précédents, la face déclive de l'épinotum, le milieu du métanotum, la moitié postérieure du scutellum, le col, les côtés du thorax, le dessous et les angles antérieurs de la tête et les appendices qui sont lisses ou avec une ponctuation fine et clairsemée. Ces stries sont régulières, et en général lisses au fond des sillons, et d'autant plus serrées qu'elles se trouvent plus en arrière. Les fosses antennaires et les côtés de la tête plus finement striés. Quelques stries perdues sur les côtés du thorax. Pilosité dressée brunâtre, très clairsemée. Cinquième tergite de l'abdomen pubescent.

Tête rectangulaire, près d'un tiers plus longue que large, le bord postérieur légèrement concave, les côtés droits. Les yeux presque aussi grands que le tiers des côtés de la tête et placés un peu en avant de leur milieu. Arêtes frontales parallèles, ne convergeant que vers leur bout antérieur, prolongées derrière par une ride. Le scape large comme le quart de sa longueur atteint, récliné dans son scrobe, le niveau du bord antérieur de l'oeil. Mandibules striées vers l'apex, lisses vers la base, de 7 dents dont les 4 postérieures plus petites.