

que celui-ci puisse être maintenu. Le pecten n'est pas toujours possible à voir simultanément sur les deux éperons parce que leur plan est perpendiculaire l'un à l'autre.

*Ponera menozzii*, n. nom.

pour *P. longiceps* Menozzi (1931) nom. preocc. Forel (1913).

*Pseudomyrma künckeli* Em. v. *bierigi*, n. var.

♀. Long: 5 mm. Diffère du type par sa coloration plus foncée. Le corps est brun foncé, presque noir, seuls la tête, les antennes et les petits tarses sont roux ferrugineux. La tête est très luisante. Les stomates épinoaux plus saillants. Pour le reste semblable.

Panama: Juan Diaz II.VI. 30. 1 ♀ (A. Bierig).

La variété *dichroa* Forel est plus robuste, le thorax en partie roux ferrugineux, les parties obscures d'un brun plus clair.

*Crematogaster (Eucrema) acuta* F. v. *centralis*, n. var.

♀. Les exemplaires de l'Amérique centrale et de Colombie que j'ai sous les yeux diffèrent de ceux du Brésil, que je considère comme typiques, par leur sculpture beaucoup moins rude, soit par l'absence plus ou moins complète du grossier reticulum de rides sur la tête et l'épinothum où ne persiste guère qu'une fine ponctuation réticulée. Les épines sont un peu plus minces et plus courtes. La taille légèrement plus faible. Noire. Pour le reste semblable.

Par la sculpture cette variété ressemble à *C. evalens*, mais la forme est bien celle de *C. acuta* F.

♀. V. Long: 7 mm. Noire. Pattes noire brunâtre. Petits tarses bruns. Luisante. Lisse, avec une ponctuation fine et espacée. Côtés du prosternum finement et densément ponctués. Pilosité dressée claire, abondante sur le corps et les appendices, plus particulièrement longue sur le côté extenseur des pattes moyennes et postérieures.

Tête carrée, un peu plus large devant que derrière, les côtés presque droits, le bord basal convexe avec les angles arrondis jusque près des yeux. Ceux-ci, très convexes, occupent le tiers environ des côtés de la tête dont ils atteignent le quart postérieur. Ocelles latéraux et médian distants d'environ une fois et demi leur diamètre. Sillon frontal nul. Aire frontale faiblement imprimée. Epistome très large, le bord antérieur