

tempes, face occipitale hanches et gastre lisses et très luisants. Le reste est mat ou submat très finement et densément ponctué chagriné, mais, suivant les individus, cette sculpture s'efface en partie et devient plus luisante, par exemple sur les côtés du front, les épaules pronotales et le dessus des nœuds. En outre, des rides très fines et irrégulières font un faisceau entre les crêtes frontales mais ne dépassent pas le milieu du front; d'autres s'étendent transversalement sur le devant du pronotum et les côtés du thorax. L'épinothum est fortement ridé en travers. Psammophore bien développé. Quelques poils sur la tête et dessous le gastre, parfois un ou deux sur le mesonotum, le reste du corps glabre. Une pubescence espacée sur les cuisses, plus dense sur les tibias.

Tête carrée, les angles postérieurs arrondis, comme chez *sublæviceps*, les yeux un peu plus grands. L'aire frontale peu imprimée, lisse ou finement striolée. Le scape dépasse le bord basal. Convexité promesonotale un peu plus allongée. L'épinothum est plus allongé, sa face basale plus de deux fois plus longue que la déclive, toutes deux font un angle droit très apparent, la déclive étant verticale dans sa moitié ou ses trois quarts supérieurs, selon les exemplaires. Parfois la face basale un peu arquée derrière, chez les petites ouvrières. Pétiole plus haut que le postpétiole, mais un peu moins que chez *sublæviceps*. Le bord antérieur droit, le postérieur en angle plus ou moins arrondi, le sommet entier. Postpétiole une demi à deux tiers plus large que le pétiole.

Voisin de la race *hoggarensis* Sants, par son épinothum carré, mais cette dernière est plus fortement ridée, son pétiole plus bas et plus épais. Chez *sublæviceps* et ses variétés l'angle épinothumal est nettement obtus, ainsi que chez *medioruber* For.

Tougourt : 11 XII, 1932 (A. Leclercq) plusieurs ♀ communiquées par le Muséum de Paris et portant la mention : (Fourmis des dunes) (1).

CREMATOGASTER (ACROCÆLIA) AUBERTI Em. st. OASIMUM Sants.
v. *airensis* n. var.

♀. Long : 4 mm, 2. Noire; antennes, mandibules, col, pédicule du pédoncule et articulations des pattes d'un brun rougeâtre; tarses brun jaunâtre; reste des pattes brun noir. Tête lisse et luisante. Joux striées. Aire frontale et côtés des crêtes frontales striolés. Pronotum lisse et luisant au milieu, ses côtés et le mesonotum espacement et faiblement ridés. Épinothum et mésépisternum striés avec des réticulations dans le fond des stries de ce dernier. Abdomen lisse. Pilosité dressée clairsemée. Pattes seulement pu-

(1) *Messor semirufus* André v. *nigricans* n. nov. = *M. semirufus* v. *nigriceps* Santschi 1929 (n. praec. Santschi, 1925).