

bescentes. Tête près d'un tiers plus large que longue (comme chez *oasium*). Le scape dépasse de 1/6 à 1/5 le bord postérieur de la tête. Épinothum très brièvement denté, bien plus que chez *oasium*. Le trapèze du pétiole aussi large devant que de côté, plat dessus. Du reste comme *oasium*, mais plus petit et autrement coloré.

♂ Long : 4^{mm},6. Brun foncé; tête noirâtre; appendices brun de poix. Lisse et luisant avec une assez forte ponctuation plus ou moins espacée, sur la tête et le mésonotum. Tête un peu plus large, plus anguleuse derrière et articles du funicule distinctement plus longs que chez *auberti*. Ailes hyalines, pour le reste comme chez *auberti*, mais plus grand.

Sahara nigérien Air, Tasolé. (A. CHEVALIER).

Émery, 1922, fait de *oasium* une simple variété de la race *antaris*, dont la tête est carrée, les yeux plus petits et l'habitat montagneux. Je considère *oasium* comme race ou sous-espèce distincte en raison de sa tête beaucoup plus large que longue, ses yeux relativement grands et son habitat déserticole.

CATAGLYPHIS (CATAGLYPHIS) BICOLOR F. st. LÆVIOR Stitz
v. **rufidens** n. var.

♀. Couleurs tranchées rouge et noir comme chez le type *lævior* dont cette variété diffère par le gastre moins luisant, presque aussi mat que chez *oasium* Sants. et *desertorum* For. Outre sa vive coloration, *rufidens* diffère de ces deux dernières variétés par ses dents rouges, concolores à la tête et au thorax. Les scapes n'ont que rarement un ou deux poils dressés.

♀. Long : 11 millimètres. Tête et ses appendices, dessus du thorax, dessous du pétiole, articulations des pattes rouge assez vif. Tarses roussâtres. Reste des pattes et de l'abdomen noir, côtés du pronotum et mésépisternum noirâtres. Occiput et côtés du gastre lisses et luisants, le reste mat ou submat comme chez l'ouvrière. L'écaïlle est plus haute que chez celle-ci et plus mince que chez *desertorum* ♀. L'épinothum plus convexe que chez cette dernière, le reste semblable.

Reggán ⁽¹⁾ (= en arabe Halebou) 26 I 1932. (A. LECLERCQ), plusieurs ♀ et ♀ au Muséum de Paris et dans ma collection.

CATAGLYPHIS (CATAGLYPHIS) ALBICANS Roger st. LIVIDA André
v. ARENARIA Forel 1909, Santschi 1929.

Reggan 26, 1, 1932. Plusieurs ♀.

CATAGLYPHIS (MACHÆROMYRMA) BOMBYCINA Roger.

Air : Tasolé, plusieurs ♀. Cette espèce se montre ainsi répandue dans tout le Sahara.

(1) Reggan se trouve par 26,40 lat. N. à l'entrée du grand désert Tanezrouft.