

des pattes, impressions transversales des joues); mais je pense actuellement pouvoir en faire deux espèces distinctes caractérisées par la pilosité du dessous de la tête, abondante chez *erigens*, nulle chez *magister*.

CAMPONOTUS (MYRMOTREMA) GALLA Forel.

De Bardai à Verbi 1 ♀. Cette espèce provient de l'Afrique orientale.

CATAGLYPHIS (CATAGLYPHIS) BICOLOR F. st. NODUS Brul. v. OASIUM Sants.

Vallée de Yebbi, Tibesti nord, une ♀ un peu plus foncée sur le thorax que *oasium*, d'ailleurs semblable.

CATAGLYPHIS (MACHÆROMYRMA) BOMBYCINUS Roger.

Entre Guezenti et Bardai, Région de Bardai. Vallée de Misky, Tibesti est ♀. Espèce essentiellement arénicole, habite tout le Sahara.

C'est la première fois que la faune myrmécologique du Tibesti peut être étudiée. Malgré le matériel encore restreint, on peut constater quatre espèces sahariennes, deux d'Égypte et Afrique Orientale, une de l'Afrique Occidentale et Soudan. Pas trace de formes de l'Afrique mineure alors que celles-ci sont bien représentées dans le Hoggar.