

# Fourmis du Portugal

DÉTERMINÉES PAR LE

DR. F. SANTSCHI

Ces insectes appartiennent au *Museu Zoológico de Coimbra* et m'ont été communiqués par Monsieur JOSÉ M. DUSMET.

## Sous famille des MYRMYCINAE

*Messor barbarus* L. Soure, V-22 (1184) 2 ♂. Faro, 8-IX-21 (1080) 1 ♀ R. Ald. N. S./Bento, V-22 (1181) 1 ♂. Évora (Mitra) 17-X-23 (1555) 1 ♂.

*Messor barbarus* L. st. *capitatus* LATR. Passarella, 16-V-23 (1492) 1 ♂.

*Phéidole pallidula* NYL. st. *tristis* FOREL st. *cicatricosa* STITZ ♀ (non décrite) Tête et thorax d'un brun noirâtre, abdomen brun roussâtre. Rides de la tête régulières avec les intervalles luisants. Le postpétiole est bien plus large que chez *pallidula*, même plus large, les côtés plus aigus, que chez *tristis* et bien moins fortement sculptés que chez cette dernière.

S. da Cabreira, 2-VIII-28 (2336) 1 ♀. V.

*Leptothorax* sp? Mogofores, VIII-27 (223). Une ♀. Longue de 7,5<sup>mm</sup>. Thorax rouge, le mésonotum trimaculé de brun. Tête et gastre noirâtres. Parait voisine de *L. fuentei* Sants, mais sans les ♂ l'identification n'est pas certaine.

*Tetramorium* sp? Herd. da Mitra, 21-VI (1416) 1 ♂. Caractérisé par son épinothum denté et le sommet du pétiole