

Camponotus (Myrmetoma) piceus st. *spissinodis* v. *figaro* EM. Soure, V-22 (1184) 1 ♂. Alcamises, 23-V-23 (1363) 1 ♂.

Camponotus (Colobopsis) truncatus SPIN. Evora (Mitra) 14-X-26 (2170) 1 ♀.

Lasius niger L. Soure, III-18 (403) 1 ♂. Mata de Leiria, 11-VII-25 (1806) 1 ♀, 15-VII-27 (2181) 1 ♀, 7-VII-25 (1800) 1 ♀, 8-VIII-25 (1835) 1 ♂.

Lasius emarginatus LATR. Soure, III-18 (403) 1 ♂. S. Pedro de Moel, 17-IX-23 (1802) 1 ♀.

Lasius brunneus LATR. Ald. N. S. Bento, VI-23, 1 ♀.

Formica (Formica) truncorum F. st. *dusmeti* EM. ♀ V. (non décrite) Longue 10^{mm}. Couleur comme chez *truncorum* avec la tache du front plus nette et celle de la base du gastre plus étendue. Diffère de ce type par la pilosité plus rare et surtout plus courte sur le mésonotum et les cuisses. La tête est un peu plus rétrécie devant. Le reste comme chez *truncorum*. Portugal: Soure, 15-VII-22 (1187) 1 ♀ type -- Santarém, 25-III-23 (1484) 1 ♂. Jugueiras (Felg.) (1941) ♂. Le ♂ diffère peu de celui de *truncorum*.

? Bondeit'ig
♀ allotype de
La Sierra de Gandarim

Formica (Serviformica) subrufa ROG. Herd. da Mitra, 20-V-24 (1721) ♂. Serpa, V-18 (412) ♂. Ald. N. S. Bento, V-21 (1181) ♀. S. do Marão, 12-VIII-28 (2313) 1 ♀.

Formica (Serviformica) fusca L. Mata de Leiria, 17-V-25 (1818) ♂.

Formica (Serviformica) fusca st. *glebaria* NYL. Coruche, 3-V-21 (947) 1 ♂. Ald. N. S. Bento, 10-VI-23 (1271) 1 ♂.

Formica (Serviformica) rufibarbis F. Soure, 15-VI-22 (1186) 1 ♀.

Cataglyphis (Monocombus) hispanica FOR. Mitra, 21-V-23 (1257) 1 ♂.

Cataglyphis (Monocombus) hispanica v. *nigroides* SANTS. Passarella, X-23 (1492) 1 ♂. Santarém, 25-III-27 (1484) 1 ♂.

Cataglyphis (Cataglyphis) albicans ROG. st. *iberica* EM. Mata de Leiria, 24-VII-25 (1824) 1 ♂.