

Uganda : Bwonba valley, 18-X-24, ♀ "capturée en colone" (H. HARGREAVES).

Table des variétés du *Dorylus (Anomma) kohli* Wasmann.

1. Pubescence des ♀ média et minor assez longue pour atteindre le poil suivant. Punctuation forte . . . v. *chapini* WHEEL.
- Pubescence plus courte, le poil est loin d'atteindre le suivant . . . 2.
2. Taille des ♀ ne dépassant pas 9 mm. 3.
- Taille des ♀ dépassant 9 1/2 mm. 6.
3. Tête luisante. Mandibules plus allongées . . v. *indocilis* SANTS.
- Tête mate ou presque mate. Mandibules plus courtes. . . 4.
4. Tête ornée de gros points distants de 2 à 3 fois leur diamètre v. *minor* SANTS.
- Punctuation de la tête plus fine, distance des points de 4 à 6 fois leur diamètre 5.
5. Tête nettement rétrécie derrière ; les côtés plus convexes sp. *kohli* Wasm.
- Côtés de la tête plus parallèles v. *frenisyi* FOR.
6. Côtés de la tête plus droits, s'infléchissant à partir du quart ou du cinquième postérieur v. *militaris* SANTS.
7. Brun rouge foncé, les joues pas ou à peine plus éclaircies v. *congolensis* SANTS.
- D'un brun rouge jaunâtre, thorax et joues plus clairs . . . 8.
8. Epistome non aussi clair que les joues . . v. *victoriae* SANTS.
- Epistome aussi clair que les joues, le quart antérieur de la tête formant une bande transversale jaunâtre clair . v. *langi* WHEEL.

Toutes les formes ci-dessus (sauf la v. *frenisyi* FOR.) sont classées sur les types eux mêmes en ma collection. Le ♀ se distingue par ses mandibules privées de denticules et de dent préapicale.

D. (A.) *nigricans* Ill. st. *stanleyi* For.

Soudan égyptien : 1-1-25, 1 ♂ "at light" (H. H. KING).

***Dorylus (Rhogmus) fimbriatu* Shuck. v. *laevipodex* SANTS.**

Soudan égyptien : Kōalib Hill., 8-XII-20 (H. H. KING), 1 ♂ ; idem. Forit, 12-II-17 (J. R. YARDLEY), 1 ♂ ; idem. Khartoum, 20-I-18 (R. COTTAM), 1 ♂. Ces trois mâles sont un peu plus petits que le type de la variété et font passage au type de l'espèce.

***Ænictus hamifer* Em.**

Soudan égyptien : Khartoum, 18-II-25 "at light", 1 ♂ (H. B. JOHNSON).