

C. (O.) sericeus v. obtusus SM.

Soudan égyptien : Medoui, 4-I-23, 1 ♀ " at Light " (H. B. JOHNSON).

Polyrhachis (Myrma) laboriosa SM.

Sierra Leone : Bout, 11-V-24, 1 ♀ (E. HARGREAVES).

P. (M.) atrociliata SANTS.

Sierra Leone : Waterloo, 23-VIII-25, 1 ♀ (E. HARGREAVES) ;
Congo belge : Haut Uélé, Moto (L. BURGEON), 1 ♀.

P. (M.) schistacea MAYR. st. **fracta** SANTS.

Lac Nyanza, 1 ♀ (BONDROIT) ; Beni (Lt BORGERHOFF), 1 ♀.

Cataglyphis (Cataglyphis) bicolor F. st. ^{nodus}**nuda** BRUL. v. **sudanica** KARAWAIEW, 1912, *Rev. Russe d'Ent.*, p. 590.

Cet auteur ne distingue cette variété que par la forme des valves internes de l'armure génitale mâle ; en réalité, le ♂ diffère comme suit : Long. : 9,5 à 10 mm. Tête et thorax noir. Mandibules, hanches, fémurs de la première paire et écaille brun foncé. Abdomen et reste des appendices d'un rouge un peu brunâtre. Mat. Face occipitale, devant du pronotum, lingula, face basale de l'épinotum luisant. Pilosité comme chez *bicolor*. Tête un peu plus rétrécie devant que chez *nodus*. Pétiote un peu plus épais au sommet sur le profil que chez le type. Pour le reste comme chez *nodus*.

♀. — Diffère de la v. *oasium* FOR. par la tête un peu plus étroite, l'écaille plus basse et plus arrondie au sommet. Le gastre à peine plus luisant. Un peu moins robuste.

Soudan égyptien : Kodraco, 3-IV-13 20, 2 ♀, 2 ♂ (H. KING).
Le type ♂ de *sudanicus* KARAW. est de Port Soudan.