

et Berlin, et d'autres pour les exemplaires précieux qu'ils ont bien voulu me communiquer.

*Aphaenogaster (Aphaenogaster) testaceopilosa* Lucas.

Syn. *Myrmica testaceopilosa*. LUCAS 1846, p. 301, ♂.

*Aphaenogaster testaceopilosa*. EMERY 1922, p. 62 (partim et Auct.).

*Aph. testaceopilosa* v. *cabylica*. SANTSCHI 1929, p. 141, fig. 1, ♀ (non STITZ).

♂ (fig. 21). Long. : 5mm,5-7mm,2. Noire, appendices bruns plus ou moins clairs, les hanches et les cuisses souvent plus foncées. Mate. Densément réticulée ponctuée, avec des rides longitudinales assez denses sur le front, s'effaçant en partie depuis le vertex en arrière. Le thorax est également ridé mais, chez les grands individus, ces rides sont irrégulièrement disposées sur le pronotum et les côtés du thorax, tandis que chez les ♀ moyennes et surtout les petites, elles s'effacent de plus en plus, d'abord sur le mésopleurosternum, puis sur le métasternum et les côtés du pronotum sans y disparaître entièrement. Quelques rides sur les nœuds; gastre finement strié moiré, plus finement sur les côtés, le dessous lisse. Pilosité dressée roussâtre ou jaune pâle, parfois plus claire, un peu épaisse, pointue et abondante partout.

Tête d'un tiers à un sixième plus longue que large, un peu rétrécie devant, les angles postérieurs assez indiqués bien qu'arrondis (fig. 12), les côtés peu arqués. Le scape dépasse d'un quart environ le bord basal. Massue antennaire assez épaisse, le pénultième article du funicule deux fois ou à peine un peu plus de deux fois plus long qu'épais. Aire frontale, épistome et mandibules striés. Epines droites, faiblement relevées sur le plan de la face basale de l'épinotum et un peu plus courtes que leur intervalle. Pédoncule relativement plus robuste que chez les autres espèces, le nœud du pétiole arrondi dessus. Nœud du postpétiole environ un quart plus large que le pétiole, plus haut que long et à sommet arrondi.

♀. R. Long. : 8mm,5 (fig. 11). Couleur et pilosité comme chez la ♀. Sculpture plus accusée, rides du front plus serrées, la face occipitale plus rugueuse. Pronotum irrégulièrement ridé en travers. Mésonotum et scutellum très rugueux, avec la taeniola large et peu luisante. Epinotum et métasternum fortement et assez régulière-