

ment striés ridés. Le mésosternum n'est ridé que vers son bord inférieur.

Tête un peu plus longue que large, légèrement plus étroite devant, les côtés faiblement convexes avec les angles postérieurs arrondis et le bord basal un peu convexe. Yeux à peine plus grands que la moitié de leur distance au bord antérieur de la tête. Diamètre des ocelles comme un peu moins du tiers de leur intervalle. Aire frontale très imprimée. Le scape dépasse d'environ un cinquième le bord basal. Avant-dernier article du funicule un peu moins de deux fois plus épais que long. Thorax plus étroit que la tête, environ deux fois plus long que haut. Face antérieure déclive du mésonotum moins haute que la partie sousjacent du pronotum. Scutellum peu élevé derrière. La face déclive de l'épinotum a un profil rectiligne, faiblement incliné, faisant un angle très ouvert avec le dessus du mésonotum; elle est armée d'épines courtes, épaisses, mousses, dirigées en arrière et un peu relevée au-dessus du plan de cette face. Nœud du pétiole pas plus haut que la longueur de son pédicule antérieur. Postpétiole aussi haut que le pétiole et que long.

J'ai décrit brièvement et figuré cette ♀ (1929), c'est pourquoi je complète ici sa diagnose.

♂. Inconnu.

#### Var. *cabylica* Stitz.

*Aph. testaceopilosa* subsp. *cabylica*. STITZ, 1917, p. 341, fig. 10. — EMERY, 1922, p. 62.

♀. Cette variété est très voisine du type, avec lequel elle est reliée par de nombreuses formes de passage. Elle en diffère par la sculpture plus accusée sur les côtés du thorax; les rides ne paraissent pas s'effacer chez les petits individus et les épines sont souvent plus longues, la couleur est plus noirâtre sur les appendices, surtout cuisses et tibias.

♀ et ♂ inconnus.

Algérie (LUCAS, 7, VII, 49). — Boubarak, près Dellys. — Boghni (Insectarium d'Alger).

#### Var. *canescens* Emery.

*Stenammas (Aphaenogaster) testaceopilosa* subsp. *canescens*. EMERY, 1895, p. 302.

*Aph. (Aph.) testaceopilosa* subsp. *canescens*. EMERY 1908, p. 322. 1922, p. 62.