

♀. Comme la var. *cabylica*, mais la pilosité est plus longue et nettement plus fine.

♀ et ♂ inconnus.

Tunisie: Beja (types) FOREL. — Tebourouk (Coll. MENOZZI). — Aïn Draham (J. MADER).

*Aphaenogaster (Aphaenogaster) depilis* Santschi (fig. 4, 8, 10, 23, 31).

Syn. *A. testaceopilosa* Luc. v. *depilis*. SANTSCHI 1911.

J'ai décrit autrefois cette forme sur des individus presque dépourvus de pilosité dressée, pensant alors qu'il s'agissait d'un caractère naturel; maintenant, après un examen plus attentif, je doute fort de sa valeur. En effet, il existe de nombreux points d'insertion pilifère sur tout le corps comme chez les autres espèces et races voisinant *testaceopilosa*. Il y a donc lieu d'admettre que *depilis* est en réalité aussi poilue que ces espèces et que la glabrité de mes types n'est qu'accidentelle. Néanmoins, *depilis* appartient à une forme très commune dans l'Afrique du Nord et bien distincte du vrai *Aph. testaceopilosa* Luc. avec laquelle elle a été jusqu'ici confondue et, comme elle a été la première décrite, force reste de lui laisser un nom si mal approprié. Voici maintenant la description de cette espèce:

♀. Long.: 5,5 à 6mm,6. Noire, appendices rouge-brunâtre plus ou moins foncés. Mate, densément réticulée ponctuée, quelques faibles rides allongées et espacées sur la tête, un peu plus fortes vers le front et parfois vers le bas du métasternum, le reste du thorax sans ride. Aire frontale striée et un peu luisante. Gastre finement strié moiré dessus, lisse et luisant dessous. Les hanches plus finement sculptées que le thorax. Pilosité dressée blanchâtre comme chez *testaceopilosa*.

Tête plus étroite et moins variable que chez *testaceopilosa* (fig. 8). Elle est surtout plus étroite derrière que devant (de moitié environ) et ses angles postérieurs sont effacés, les côtés faiblement convexes des yeux au bord cervical. Mandibules striées, armées de deux dents apicales suivies de 5 à 6 dents plus petites et irrégulières. Le scape dépasse de près d'un tiers le bord cervical. Avant-dernier article du funicule au moins 2½ fois plus long qu'épais. Pronotum convexe comme chez *testaceopilosa* (fig. 23). La face basale de l'épinothum droite, près de deux fois aussi longue que la déclive. Epines fines.