

l'intervalle de leur base. Nœud du pétiole près d'un quart plus haut que le postpétiole, bien plus haut et plus étroit que chez *testaceopilosa*. Postpétiole plus long que haut, presque le double plus long que large. Gastre plus réticulé à la base que chez *testaceopilosa*.

Maroc: Rabat, première quinzaine d'avril. 1928, 5 ♂ (types) (OTIN). — Id., 1 ♀ (type) (THÉRY). — Fez, 1 ♀. Cette espèce est caractérisée par son pétiole plus élevé que chez les autres formes du groupe *testaceopilosa*.

Var. *confinis* n. var.

♂. Long.: 5mm,5-5mm,7. Diffère de *praenoda*, outre sa taille plus faible et ses ailes plus claires, par sa tête légèrement plus courte et surtout par le nœud du pétiole moins haut, bien que plus haut que chez *senilis*, et nettement triangulaire, le sommet brièvement arrondi.

Cette variété fait un peu transition à *senilis*, var. *disjuncta*, mais la base de la tête est arrondie comme chez le type et non tronquée.

Maroc: Casablanca: Hiver 1920-21 (ANTOINE) 2 ♂ Coll. MENOZZI. —

*Aphaenogaster (Aphaenogaster) praedo* Emery 1908, p. 310, 323, fig. 12.

Cette jolie espèce à tête et thorax ferrugineux est caractérisée par sa tête très allongée, presque de moitié plus étroite derrière que devant, avec les côtés rectilignes des yeux au bord basal. Ce bord se confond avec le bord cervical et paraît échancré vu de derrière. A part sa fine ponctuation réticulée fondamentale, elle n'a que quelques faibles rides sur la tête et les côtes du thorax. Les sexués sont encore inconnus ou non identifiés bien que cette forme ne paraisse pas rare au Maroc d'où je l'ai reçue plusieurs fois.

Route de Marakech et Chichaoua (ex coll. H. VAUCHER), types et cotypes. — Grand Atlas: Ourum er Rebia et Anti Atlas, Djbel Inter (ALLUAUD). — Grand Atlas: Amismiz (THÉRY).

Var. *atlantis* Santschi 1929, p. 139. ♀

Noire concolor, avec les mandibules, le funicule et les tarsi roux ferrugineux. L'épinothum est plus nettement ridé et les côtés de la tête légèrement arqués vers l'angle postérieur.