

Maroc: Grand Atlas, Hte-Reraya, 2400 m. alt. (ALLUAUD). — Grand Atlas, Arround (LINDBERG).

Var. *ellipsoïda* n. var. (fig. 13).

♀. Diffère du type par la tête plus étroite devant et encore plus allongée. En outre, les côtés de la tête et du thorax sont plus ou moins maculés de brun, le reste comme chez *praedo*, l'aire frontale brune. Rides du thorax plus nombreuses.

Maroc: Djbel Amsiten 16-18.V.26 (LINDBERG). J'avais confondu autre fois cette forme avec le type.

Aphaenogaster (Aphaenogaster) campana Emery (fig. 15, 33, 38).

Syn. *A. testaceopilosa* var. *campana*. EMERY 1878, p. 54, ♀, ♀, ♂, fig.

A. testaceopilosa subsp. *campana*. EMERY 1908, p. 322, ♀, ♀, ♂, fig. 11; 1911, p. 131, 136, 140.

Grâce à M. MENOZZI, j'ai pu examiner directement les types ou cotypes de cette espèce provenant de Portici (Collection EMERY) et me convaincre qu'elle mérite d'être élevée au rang d'espèce.

♀. Elle est caractérisée par sa sculpture formée de rides disposées en un réseau de mailles surajoutées à la ponctuation réticulaire du fond et ayant un aspect plus rugueux que chez les espèces voisines. La tête ressemble à celle de *depilis* Sants. Les épines sont horizontales, sur le même plan que la face basale de l'épinotum et pas plus longues que l'intervalle de leur base. Pétiole et postpétiole un peu plus épais que chez *depilis*.

♀. La tête est presque aussi large que chez *testaceopilosa*, mais les angles moins marqués. L'épinotum est encore plus horizontal et les épines longues et déliées, sur le même plan que la face basale. Ces épines la différencient nettement de *sardoa* Mayr dont la couleur est parfois un peu moins foncée.

♂. Tête courte comme chez *depilis* (Fig. 5). La taille est, relativement à la ♀, plus petite que chez les autres formes (4 à 4^{mm},4) et le profil de l'épinotum très spécial (fig. 33). La taeniola est fortement imprimée. Ailes d'un jaune brunâtre, nervures brunes. M. EMERY (1878) écrit que cette espèce est noire, mais les exemplaires de sa collection que j'ai sous les yeux sont d'un brun rougeâtre ou ferrugineux avec le gastre noirâtre et les appendices brun clairs. Il me paraît douteux que cette différence soit due à la vétusté, le gastre restant noir.