

denté. La face déclive est verticale et un peu concave. Nœud du pétiole aussi haut que la longueur de son pédicule et aussi épais. Postpétiole environ deux fois plus haut et plus large que long.

♂. Long. : 6mm,5 (fig. 27). Noir; appendices brunâtres, plus clairs aux articulations et aux tarses. Réticulé ponctué, presque sans rides. Côtés du thorax, épinothum et abdomen luisants. Pilosité beaucoup plus clairsemée et plus fine que chez l'ouvrière, plus oblique sur les appendices.

Tête (avec les yeux) plus large que longue; ceux-ci très convexes en occupent la moitié des côtés et n'atteignent pas l'angle antérieur de la tête. Ocelles bien plus grands que leur intervalle. Sillon frontal distinct. Epistome légèrement échancré devant. Mandibules lisses, de quatre dents et deux denticules, l'apicale longue. Le scape atteint l'ocelle médian et est presque aussi long que le dernier article du funicule. Thorax aussi large que la tête et plus de deux fois plus long que haut. Le mésonotum recouvre le pronotum. Epinothum aussi long que le reste du thorax, ses deux faces forment une ligne oblique, faiblement sinueuse, du métanotum à l'articulation du pétiole. L'angle de l'épinothum est indiqué par un tubercule latéral ne faisant pas saillie sur le profil. Pétiole très allongé, avec un nœud arrondi, aussi haut que l'épaisseur du pédicule. Postpétiole aussi long que les deux tiers du pétiole, le nœud triangulaire, à sommet arrondi, un quart moins haut que long. Ailes hyalines, à nervures pâles et tache brune. Pattes longues et grêles. L'identification de ce ♂ à la var. *tingitana* n'est pas absolument certaine.

Maroc: Tanger, ♀ et ♂ (types) (HERZEN). — Asni, ♂ (ALLUAUD). — Charf el Arab, ♀. — Marakech, ♀ (ALLUAUD). — Rabat, ♀ (THÉRY).

Var. *curiosa* n. var. (fig. 7, 28).

♂. Long.: 6mm environ. Diffère de la variété précédente par la tête un peu plus large. Le sillon frontal réduit en un trait lisse. Mandibules plus longues, de 6 à 7 dents, l'apicale beaucoup plus longue. Les tubercules latéraux de l'épinothum plus accusés. Les nœuds du pétiole et surtout du postpétiole plus bas.

Maroc: Grand Atlas, Haute Reraya, 1 ♂ (C. ALLUAUD).

Une ♀ R. de Tanger, ex coll. VAUCHER, ne diffère de celle de *tingitana* que par les épines épinothales plus longues, aussi longues qu'espacées au bout (bien plus courtes que leur intervalle chez cette