

variété). Scape un peu plus épais, rouge-brunâtre ainsi que la moitié basale du funicule et les tarsi. C'est peut-être la ♀ de *curiosa*.

*Aphaenogaster (Aphaenogaster) gemella* Rog. st. *marocana* Forel (fig. 6, 24, 29).

Syn. *A. testaceopilosa* v. *marocana*. FOREL 1903, p. 257, ♀, ♂.

*A. testaceopilosa gemella* v. *marocana*. EMERY 1908, p. 319, ♀, ♂, fig.; 1922, p. 63. — SANTSCI 1929, p. 140, ♀, fig. 3.

♀. Plus robuste que *gemella* et ses variétés, la tête beaucoup plus fortement ridée en long, le thorax n'est que réticulé ponctué comme chez *gemella*. L'épinotum armé de courtes épines, plus longues que chez *tingitana*, mais plus courtes que chez *testaceopilosa*. Les deux nœuds sont de même hauteur ce qui la distingue de *senilis* v. *disjuncta* Sants. La tête est aussi plus rectangulaire que chez cette dernière forme, aussi large derrière que devant, avec les angles postérieurs aussi nets que chez *testaceopilosa*.

♀ R. Long.: 10mm-11mm. Mate. Réticulée ponctué comme *tingitana*, mais les rides sont plus anastomosées sur le vertex. Mésonotum ridé en travers devant; irrégulièrement ridé rugueux derrière et sur le scutellum. Epinotum ridé en travers. Les rides s'étendent sur les côtés tout en s'effaçant sur le mésopleurosternum. Premier tergite du gastre strié moiré; les suivants lisses et luisants, sauf un petit espace sur le dos du deuxième.

Tête plus large que chez *tingitana*, moins que chez *testaceopilosa* et un peu plus allongée. Les ocelles près de trois fois plus petits que leur intervalle. Les yeux légèrement plus grands que chez *testaceopilosa*. Aire frontale en partie striée et assez luisante. La face antérieure, déclive, du mésonotum descend presque verticalement sur le pronotum; elle est d'un tiers environ plus courte que la face basale. La face basale de l'épinotum est sur un plan beaucoup plus oblique, par rapport à celui du mésonotum, que chez *tingitana*. Elle se termine par de fortes épines, mousses, arquées en dedans et aussi longues que leur intervalle. Nœuds du pétiole plus épais que chez *gemella*. Le postpétiole relativement plus court que chez cette forme, à peu près comme le pétiole. Vu de dessus, il est environ deux fois plus large que long. Abdomen massif.