

*Eciton (Acamatus) angustinode* Em.

Loreto, 4 ♂, 11-IX-1932 (en terre, sous une pierre), (A. A. Ogloblin),  
n° 1989.

*Eciton (Acamatus) silvestrii* Em.

Loreto, 17-VIII-1932, 3 ♂. La tête des grandes ♂ est relativement plus courte, moins échancrée et plus étroite derrière que chez *bohlsi* Em.

Sousfamille des **PSEUDOMYRMICINAE** Wheeler

*Pseudomyrma elegans* Sm. v. *infusca* For. ?

Une ♀ à tête plus courte, angles du pronotum non dentés, postpé-  
tiole plus petit. Tête et gastre noirs; dessus du thorax, mandibules,  
funicule, cuisses et tibias bruns; le reste d'un rouge brunâtre. Long.  
5,5 mm.

Loreto. N° 1979.

Sousfamille des **MYRMICINAE** Lepel

*Pogonomyrma (Ephebomyrma) naegeli* For. v. *abdominalis* Sants.

Loreto. 2 ♂, n° 1995.

*Pheidole (Pheidole) flavens* Rog. st. *rudigenis* Em.

Loreto. 1 ♂, n° 1960. Correspond très bien à la description du type,  
mais le gastre est plus foncé en arrière. La race *alacris* Sants. me  
paraît devoir se placer comme variété de *rudigenis*.

*Pheidole (Pheidole) flavens* Rog. v. *mediorubra* n. var.

♂. Long. 2,6 mm. Thorax, quart antérieur de la tête et mandibules,  
d'un rouge testacé. Reste de la tête d'un brun foncé. Gastre noir (vu  
de devant) mais à base jaunâtre quand il est vu de derrière. Pattes  
et antennes d'un jaune brunâtre, le milieu des cuisses, des tibias et  
les scapes rembrunis. Pour le reste comme chez *rudigenis*.

♀. Long. 1,7 mm. Couleurs chaudes, comme chez le soldat. Réticu-  
lée ponctuée avec de petites rides frontales atteignant le vertex,  
d'autres plus courtes sur les joues. Dessus des deux nœuds lisse et  
luisant. Pour le reste comme chez *alacris*.

Loreto. 1 ♂, 1 ♀, n° 1961.

*Pheidole (Pheidole) flavens* Rog. st. *tuberculata* Em. v. *iheringi* Em.

Santa Fe: Fives Lille, ♂, ♀, Weiser, 1920, n° 1919. Buenos Aires,  
Bruch. ♂, n° 1914, 152. Ces exemplaires se rapportent à ceux de