

*Orematogaster (Neocrema) corvina* Mayr.

(= *Orematogaster (Orthocrema) corvina* Emery (1922, Cat. Gen. Insect. Myrm.)).

Le postpétiole nettement silloné fait de cette forme un vrai *Neocrema*.

*Solenopsis (Solenopsis) saevissima* Sm. v. *macdonaghi* Sants.

Dans son importante révision des *Solenopsis* américains (*Proc. of the Amer. Acad. Art. Sc.*, LXVI, 1930), M. W. B. Creighton confond cette variété avec la var. *interrupta*; la distinction est cependant facile quand on possède la série des grandes et petites ouvrières. En effet, ces dernières ont le gastre entièrement brun ou noir chez *macdonaghi* tandis qu'il est jaune chez *interrupta*. Chez les grandes ♀ de cette dernière forme, les taches abdominales font une bande transversale plus étroite et interrompue au milieu.

*Solenopsis (S.) saevissima* Sm. v. *richteri* For.

Loreto. ♂, n° 1983.

*Solenopsis (S.) saevissima* st. *electra* For.

Sierra de Córdoba : Alta Gracia, La Granja, ♂, ♀ (C. Bruch), n° 1999, Jujuy, ♀ (Barreto), n° 1840.

*Solenopsis (Euophthalma) metanotalis* Em. v. *picturata* Sants.

♀. (Non décrite). Long. 5 mm. D'un rouge brunâtre, tête plus claire. Parapsides, métanotum et gastre bruns. Tête carrée, à peine plus étroite en avant, les bords basal et latéraux presque droits. Les yeux ne remplissent pas tout à fait le tiers moyen des côtés de la tête. Ocelles près du bord basal, distants d'environ deux fois leur intervalle antérieur. Carènes de l'épistome très accusées, terminées par de fortes dents. Scape arqué dans son tiers basal, élargi dans son tiers distal. Thorax un peu plus étroit que la tête. L'épinotum sculpté comme chez la ♂; sa face basale presque aussi haute en avant que le scutellum, faiblement inclinée, et longue comme la moitié de la face déclive, laquelle est verticale, toutes deux unies par un angle brièvement arrondi. Pétiole aussi long, avec son pédicule, que haut, le nœud triangulaire aussi incliné en avant qu'en arrière, mousse au sommet. Postpétiole presque 2 1/2 fois plus large que long, deux fois plus large que le pétiole; les côtés en cône mousse et abaissé. Article basal du gastre 1/4 plus long que large en arrière, tronqué en avant.

Province de Buenos Aires : Rosas, F. C. Sud (J. B. Daguerre), 1 ♂, 1 ♀, n° 1930, ♀, n° 1904 a.