

*Mycetophylax emeryi* For. v. *arenaria* For.

La Rioja : Patquia, 6 ♀ (A. Breyer leg.), n° 1807. La Rioja : Iliar, 1 ♀, 1 ♂ (M. Gómez), n° 1805.

*Cyphomyrmex rimosus* Spin. st. *fuscus* Em.

Loreto. ♀, ♂, n°s 1993, 1956.

*Cyphomyrmex rimosus* Spin. st. *transversus* Em. v. *pencosensis* For.

Córdoba : Alta Gracia, La Granja, ♀, ♂ (C. Bruch), n° 1974.

*Cyphomyrmex rimosus* Spin. *transversus* Em. var.

Loreto. 1 ♀, n° 1945. La tête un peu plus foncée que chez le type, passage à *pencosensis*.

#### ***Cyphomyrmex (Cyphomyrmex) daguerrei* n. sp.**

♀. Long. 2,8 mm. D'un roux brunâtre clair. Dessus de la tête d'un noir brunâtre. Dessous de la tête, scrobes, mandibules, antennes et dessus des nœuds pédonculaires d'un brun rougeâtre. Bout de l'antenne et pattes plus jaunes que le thorax. Partout une pubescence très courte, simple, plus abondante sur le gastre que sur le thorax, légèrement épaissie sur la tête. Téguments assez unis mais mats, avec quelques très fins tubercules sur la tête, et le scrobe finement réticulé.

Tête plus longue que large, rétrécie en avant, le bord postérieur légèrement échancré, avec les angles non prolongés. Les lobes frontaux disposés en cercle dont les bords latéraux sont loin d'atteindre les côtés de la tête et laissent voir une partie du scrobe. Arêtes frontales plus droites et moins divergentes que chez *rimosus*. Aire frontale enfoncée, un peu plus longue que large. Bord antérieur de l'épistome arrondi, légèrement échancré au milieu. Mandibules allongées, de 8 à 9 dents, progressivement décroissantes d'avant en arrière. Le scape dépasse d'environ son épaisseur maxima le bord postérieur de la tête. Yeux à peine plus grands que cette épaisseur. Articles 2 à 5 du funicule légèrement plus longs qu'épais, moins longs que chez *morschi*. Thorax plus élevé que chez cette espèce. Angle inférieur du pronotum denticulé. Tubercules des angles supérieurs triangulaires, mousses, le médian peu saillant. Mésonotum à tubercules légèrement plus accentués que chez *morschi* et formant sa bordure; le dessus assez aplati. Face basale de l'épinothum horizontale sur le profil, descendant en avant dans le sillon métanotal; ses angles postérieurs denticulés. La face déclive concave, moins longuement oblique que chez *morschi*. Pétiote rectangulaire, un quart environ plus large que long. Postpé-