

phologique, et probablement aussi biologique, avec les *Oxygyne* de l'ancien continent. Ce rapprochement est rendu encore plus frappant par la découverte d'une nouvelle espèce de l'Argentine dont va suivre, plus loin, la description.

***Crematogaster (Oxygyne) donisthorpei* n. sp.**

♀. Long. 3 à 3,5 mm. Noire; appendices brun noir. Beaucoup d'individus passent au brunâtre. Très finement réticulée et assez luisante. Chez les petits exemplaires, la sculpture est plus fine, plus effacée par places. Des points épars sur la base du gastre. Pubescence très courte, médiocre. Seuls quelques poils dressés sur le bord de l'épistome et plus courts sur le bout du gastre.

Tête un peu plus longue que large, arrondie derrière les yeux. Une impression longitudinale sur la face occipitale et, parfois, sur le vertex et le front. Les côtés sont parallèles en avant des yeux, lesquels sont un peu plus grands que le quart des faces latérales de la tête. Crêtes frontales bien plus courtes que leur intervalle. Epistome convexe, subtronqué au milieu de son bord antérieur, moins fortement arqué entre les arêtes frontales. Mandibules striées, armées de quatre dents. Le scape dépasse d'un bon quart le bord postérieur de la tête. Massue indistinctement de 3 ou 4 articles assez épais. Deuxième article du funicule un tiers plus long que large, distinctement plus long que les trois suivants, qui ne sont qu'un peu plus longs qu'épais. Promésonotum convexe sur le profil, un peu déprimé dessus. Un fort sillon métanotal. Face basale de l'épinotum convexe, faiblement imprimée en long au milieu. Epines courtes, dentiformes, aiguës et horizontales. Pétiote subrectangulaire, peu élargi devant où les angles sont tronqués et suivis d'une petite encoche. Postpétiote échancré derrière, peu ou pas sillonné devant.

♀ V. Long. 3,3 à 3,5 mm. Brun roussâtre; gastre rembruni derrière. Epistome, une bande frontale, gastre et pattes luisants et lisses, ce dernier plus ponctué; le reste assez mat, grossièrement et longitudinalement ruguleux avec une grosse ponctuation irrégulière ou finement réticulée. Scutellum plus faiblement sculpté derrière. Pédoncule ruguleux ponctué sans rides longitudinales. Pilosité couchée assez longue, claire, abondante partout mais plus courte sur le gastre. Tête un peu plus longue que large, se rétrécissant en s'arrondissant à partir des yeux. Ceux-ci occupent presque le tiers des côtés de la tête. Les côtés divergent à peine en avant des yeux pour faire un angle antérieur arrondi. Ocelles petits, distants d'une fois et demi leur diamètre (plus de trois fois chez le *C. oscaris*). Epistome grand, peu convexe, à bord antérieur formant trois échancrures peu profondes limitant deux faibles lobes. Mandibules mates, à bord terminal très oblique et armé de trois denticules et d'une dent apicale longue et aiguë. Scape dépassant d'environ sa moitié le bord postérieur des yeux. Funicule à massue de trois