

convexe, lisse avec des points pilifères vers le milieu du bord antérieur qui est faiblement arqué. Mandibules lisses avec des points épars, armées de 4 dents, l'apicale notablement plus forte. Le scape dépasse d'environ un cinquième le bord basal. Premier article du funicule presque aussi long que les deux suivants réunis. Les articles 3 à 6 plus de moitié plus longs qu'épais. Massue nettement de 2 articles, le basal un peu plus long que la moitié de l'apical.

Thorax assez déprimé. Pronotum peu convexe, sans carène médiane et non bordé. Suture promésonotale peu imprimée. Le quart ou le cinquième postérieur du mésonotum descend obliquement dans le sillon métanotal, dessinant un court escalier sur le profil. Face basale de l'épinotum plane, environ deux fois plus large que longue; subbordée latéralement et passant insensiblement à la face déclive. Epines fines, aiguës, très peu divergentes, longues comme la moitié de leur intervalle, obliquement relevées et très légèrement recourbées en haut. Disque du pétiole subrectangulaire, d'un tiers environ plus long que large, un peu plus étroit derrière, les côtés très peu arqués, le dessous inerme. Post-pétiole fortement sillonné au milieu, à peine plus large que le pétiole. Base du gastre tronquée. Ressemble à première vue à *Polymnia* var. *oegria* SANTS., mais celle-ci a la tête plus large et non rétrécie devant, le pétiole plus court, la chute du mésonotum plus haute, etc.

♀ V. Long. 4,5 à 4,8 mm. Noire; appendices bruns; bord terminal et base des mandibules et tarsi jaune-brunâtre. Tête sculptée comme chez l'♂, mais la ponctuation prend une direction longitudinale qui donne l'aspect de rides. Cette dernière sculpture se retrouve plus accentuée sur le mésonotum, le scutellum et les côtés du pétiole. Les rides sont nettes, longitudinales, à peine ponctuées sur la face basale de l'épinotum. Le reste du thorax et du pédoncule régulièrement ponctués réticulés, mats. Gastre lisse et très luisant; la base un peu réticulée. Une longue pilosité claire, recourbée, espacée, s'étend sur tout le corps; elle est particulièrement longue et oblique sur l'abdomen. Une pubescence longue et oblique abonde sur les pattes et les antennes, manque sur le corps.

Tête aussi longue, ou un peu plus longue que large avec les yeux et en avant desquels les côtés sont parallèles et longs comme la moitié de leur diamètre (vu de face). A partir des yeux, les côtés de la tête s'infléchissent fortement en dedans de telle façon que la moitié postérieure de la tête paraît hémisphérique. Ocelle médian distant de plus de deux fois son diamètre des ocelles latéraux. Aire et sillons frontaux indistincts. Arêtes frontales presque parallèles et un peu plus longues que leur intervalle. Epistome lisse, presque plat dans sa plus grande partie; son bord antérieur faiblement, mais largement échancré; son bord postérieur indiqué par une faible crête régulièrement arquée. Mandibules lisses, assez pileuses, armées d'une seule, mais longue dent apicale et d'un denticule, parfois mousse, à l'angle interne de son bord terminal, celui-ci très oblique et concave. Scape dépassant d'environ un quart