

Messor ceresis n. sp.

♂. — Long. : 3,5-5 mm. Brun marron foncé. Gastre noir. Dessus de la tête, du pronotum et des deux nœuds souvent rembrunis ou noirâtres. Mandibules d'un brun un peu plus clair que les pattes. Tête lisse, luisante avec de courtes stries sur les joues et le long des arêtes frontales. Des rides assez fines sont disposées obliquement sur les méso- et métasternum, et transversalement sur l'épinotum. Chez les grandes ♀, le pronotum (sauf le dos), les côtés du mésonotum, le fond de la sculpture des côtés du thorax et le dessus des nœuds du pédoncule finement ponctués et submats, tout le reste luisant. Pilosité dressée pâle, clairsemée sur la tête et le thorax, rare sur le segment basal du gastre, plus abondante au bout de celui-ci et sous les cuisses. Les macrochètes de la gula sont nettement arqués en avant et forment un psammophore avec les poils de l'épistome. Une pubescence très oblique abonde sur les pattes et les antennes mais est très espacée sur le corps.

Tête à peine plus longue que large chez les grands individus, nettement plus allongée chez les petits, les côtés à peine arqués, le bord postérieur convexe avec les angles arrondis. Yeux ovales, un peu en arrière du milieu des côtés dont ils occupent environ un quart. Sillon frontal effacé. Epistome arqué, strié. Mandibules striées, larges, à bord externe très arqué, armées de 8 à 9 dents. Le scape faiblement lobé à la base dépasse de peu le bord postérieur de la tête. Premier article du funicule presque aussi large que le scape et deux fois plus long que large. Les articles 3 et 4 à peine plus longs qu'épais. Massue nettement de 4 articles dont les deux premiers sont environ un quart plus long qu'épais. Le promésonotum dessine en profil une courbe assez régulière, parfois légèrement imprimée en avant du mésonotum chez les plus grandes ouvrières. Les deux faces épinothoraciques, bordées, à peu près d'égale longueur, forment un angle obtus à sommet submutique, la basale un peu convexe sur le profil est transversalement concave derrière. Pétiole à pédicule inerme dessous, aussi long que la hauteur du nœud. Celui-ci, triangulaire, à sommet mousse et arqués en travers. Postpétiole aussi long que haut, arrondi dessus et près d'un quart plus large que le pétiole.

Voisin de *M. rugosus* AND., *brunneicornis* et *lobicornis* FOR. mais bien distinct par la sculpture beaucoup plus faible du thorax et sa tête lisse.

Beyrouth, 5-VIII-33, ♀. Nid populeux dans le mur d'un jardin face à la rue. La taille exigüe de cette espèce et son allure rapide la caractérise nettement. Découverte au coucher du soleil par Mme DE GOUMOIS qui me prévint de sa trouvaille.