

**M. structor** LATR. st. **muticus** NYL.

Rhodes.

**M. structor** v. **aegeus** EM.

Istanbul, ♀.

**M. structor** st. **rufitarsis** F. v. **orientalis** EM.

Turquie : Mersina, 1-VIII. Variété à gastre lisse faisant passage à la var. *alexandri* SANTS. Les nids sont populeux dans une terre rougeâtre comme l'insecte. Istanbul, ♀.

**M. structor** st. **rufitarsis** v. **muticus** NYL.

Athènes, Pirée, ♀.

**M. semirufus** ANDRÉ v. **meridionalis** ANDRÉ.

Athènes, 25-VII ; Rhodes, 30-VII ; Istanbul, 27-VII, ♀. Cette variété se distingue de la var. *intermedius* FOR. par la sculpture plus faible du thorax.

**M. semirufus** v. **intermedius** FOR.

Rhodes, 30-VII, ♀. Sur les remparts. Des exemplaires font transition à la variété précédente.

**M. semirufus** ANDR. v. **kutteri** n. var.

♀. — Long. : 7 mm. Noire. Mandibules et insertion antennaire rouge brun vif. Pattes et scape d'un brun plus ou moins foncé avec les funicules, les articulations des pattes et les tarsi rousâtres. Tête, appendices et gastre lisses, luisants, avec quelques fines stries vers les arêtes frontales et des points pilifères épars sur la face occipitale. Un fond finement ponctué sur le thorax avec des stries un peu effacées sur le promésotum et des stries plus fortes, transversales, sur l'épinothum. Mésosternum nettement ponctué, parfois quelques rides surajoutées. Cette sculpture s'efface plus ou moins sur les épaules du pronotum et le milieu du mésotum. Pédoncule ponctué, finement rugueux avec quelques rides au sommet des nœuds. La pilosité est plus rare et un peu moins longue que chez *structor* sur le thorax et très courte sur le gastre.

Tête comme chez la var. *wasmanni* ou un peu plus étroite. Le scape un peu plus long. Le promésotum dessine une convexité plus régulière, sans selle au profil du mésotum comme c'est au contraire le cas chez *wasmanni*. Face basale de l'épinothum droite sans encoche devant (plus convexe et imprimé devant chez *wasmanni*). Diffère des