

petites que chez *lorteti* mais aussi recourbées en bas. Pétiole bien plus large que chez *phoenica*, un peu arqué devant et les côtés légèrement échancrés, le dessus concave. Pour le reste comme chez *phoenica*.

Grand Liban : Tripoli de Syrie, 4 ♀. Nidifiant dans une fente de muraille humide et moussue où est adossée une fontaine, chemin du château, 3-VIII-33.

**Monomorium (Xeromyrmex) venustum** SM.

Grand Liban, Tripoli, ♀. Djebeil, ancienne Byblos, 3-VIII, ♀. Beyrouth, 4-VIII, ♀.

**M. (X.) subopacum** SM. v. **phaenicium** EM.

Beyrouth, ♀. Ces deux espèces sortent seules pendant la grande chaleur dans les endroits les plus secs.

**M. (X.) subopacum** v. **adoneum** n. var.

Grand Liban : Djebeil ou Djbla, l'ancienne Byblos, ♀. Description dans la monographie de cette espèce (in. lit.).

**Cardiocondyla elegans** EM. v. **eleonorae** FOR.

Izmir, 28-VII, ♀. Dans les ruines du château. Rhodes, 30-VII, 6 ♀. Nidifie dans la maçonnerie des remparts au nord de la ville.

**Leptothorax kemali** n. sp.

Long. : 2,5 mm. Jaune foncé. Massue rembrunie, le reste des appendices plus clairs. Gstre d'un jaune paille devant, estompé de brunâtre derrière. Tête densément réticulée pontuée et mate. Sur le front la réticulation s'allonge comme de fines rides, les externes paraissant prolonger en partie les crêtes frontales. Thorax réticulé pontué avec des rides allongées, plus rares sur le dos, qui est un peu luisant, que sur les côtés du pronotum. Pédoncule plus finement réticulé ponctué, mat. Gstre lisse. Pilosité claire; courte et tronquée.

Tête d'un quart à un cinquième plus longue que large, le bord postérieur peu convexe, les côtés s'arrondissent et convergent en arrière depuis les yeux et plus parallèles en avant de ceux-ci. Ces derniers sont assez convexes et occupent plus du cinquième médian des côtés de la tête. Epistome convexe, non caréné, sans ou à peine ridé en long. Mandibules striées vers la base, armées de 6 dents courtes. Le scape atteint le bord basal. Articles 3 à 6 du funicule beaucoup plus larges que longs. L'avant dernier un peu plus long que large. Profil du thotax presque aussi convexe que chez *L. convexus* BOND. (voir : *Ann. Soc. Ent. France*, 1918, LXXXII, p. 128, fig. 63 a), mais plus