

allongé et les épines plus longues, comme les deux tiers de la face déclives, divergentes, relevées obliquement et assez aiguës. Profil du nœud du pétiole comme chez *convexus* avec une face supérieure horizontale, une face postérieure courte mais plus arrondie. Vu de dessus le postpétiole est d'un quart plus large que long et que le pétiole.

Ressemble à *smyrnensis* FOR. par sa couleur et sa sculpture mais plus petit et bien différent par son pétiole, les épines et le funicule. Voisin de *convexus*, mais celui-ci a les épines beaucoup plus courtes. Diffère de l'espèce suivante par sa sculpture et son pédoncule.

Izmir : jardin près de la statue de Mustapha Kemal Pacha, 1 ♀.

### **Leptothorax turcicus** n. sp.

♀. — Long. : 2,6 mm. Jaune foncé, tête un peu plus obscure. Mandibules, tibias, tarsi et gaster jaune clair. Tête finement réticulée ponctuée mate, avec seules quelques rides sur les joues. Cette sculpture se retrouve mais un peu moins fine sur le thorax et le pédoncule. Côtés du thorax, surtout du pronotum ridés. Pilosité courte et claire.

Tête plus rectangulaire que chez *kemali* et *smyrnensis*, environ un cinquième plus longue que large, les angles postérieurs plus brièvement arrondis, les côtés moins convergents en arrière des yeux. Ceux-ci en occupent environ le cinquième médian. Le bord basal faiblement convexe. Crêtes frontales non prolongées par les rides. Epistome convexe, faiblement convexe, faiblement ridé. Mandibules striées, dents brune. Le scape atteint le bord postérieur de la tête. Articles 3 à 7 du funicule beaucoup plus larges que longs. L'avant-dernier aussi large que long. Profil du thorax continu, pronotum convexe, mésonotum et face basale de l'épinothorax en ligne droite. Epines assez fines, longues comme la moitié de la face déclive ou comme l'intervalle de leur base, droites, obliques en haut et en dehors. Pétiole plus court que chez *smyrnensis*, profil du nœud triangulaire, le sommet mousse, la face déclive postérieure un peu convexe. Le pédicule épais, denté dessous. Postpétiole un peu moins d'un quart plus large que le pétiole.

Voisin de *luteus* FOREL, mais celui-ci est plus pâle, la tête beaucoup plus faiblement sculptée et assez luisante, les épines plus larges à leur base et le pédicule plus long.

Izmir, une ♀.

### **Tetramorium ferox** RUZSKY v. ?

Izmir, vallée de Melès, ♀. Légère variété passant à *perpicax* SANTS.