

Tetramorium semilaeve ANDRÉ st. **syriacum** EM. v. **cyprium**

n. var.

♂. — Long. : 2,5-3 mm. Thorax brun ferrugineux foncé ; tête plus obscure ; gastre noir brunâtre ; mandibules, joues et antennes roux ferrugineux, pattes et bout du gastre d'un jaune plus ou moins brunâtre. Tête finement striée en long, environ 19 stries entre les lames frontales comme chez *rhodium* EM. avec les interstries finement réticulées ponctuées mais moins fortement au front et plus dans le lit du scape. Thorax grossièrement ridé en long avec une réticulation interposée ; la ride médiane assez rectiligne, les autres sinueuses et d'autant plus irrégulières et réticulées qu'elles se rapprochent de la face basale de l'épinothum qu'elle recouvre en partie. Le reste de cette face et les côtés du thorax finement réticulés ponctués. Dessus des nœuds fortement sculpté comme le thorax. Gastre lisse, sans stries à la base. Pubescence oblique sur les pattes, plus courte et couchée sur les scapes.

Tête à peine plus longue que large, un peu convexe derrière et avec une faible impression transversale. Epistome peu convexe finement et espacement ridé en long, la ride médiane un peu plus accusée. Mandibules striées, avec 5 dents. Thorax sans échancrure ou impression métanotale. Ses dents aiguës, un peu plus longues que larges. Pédicule du pétiole aussi long que le nœud, lequel est plus large que long. Postpétiole environ un quart plus large que le pétiole, les côtés faiblement coniques.

♀. — Long. : 5,2-5,3 mm. Brun marron foncé, gastre un peu plus clair. Epistome, mandibules et scapes roux foncé, reste des appendices jaune roussâtres. Tête finement et régulièrement striée ridée en long jusqu'au vertex. Reste de la tête, thorax et nœuds ridés réticulés comme le dos de la ♀ ou même plus grossièrement sauf sur le dos du mésonotum, le scutellum et le mésosternum où les rides sont plus faibles et plus régulièrement allongées, elles s'effacent même vers la lingua. Mandibules et épistome ridés. Gastre lisse avec des stries à la base. Tête aussi large que longue. Yeux plus convexes que chez *semilaeve*, au milieu des côtés. Le bord basal droit est atteint par le scape. Profil du thorax comme chez *semilaeve*, la face basale de l'épinothum un peu plus convexe, un peu moins oblique et un peu plus fortement dentée. Postpétiole $2 \frac{1}{4}$ fois plus large que long, les côtés subconiques.

Chypre : Limasol ♀ et plusieurs ♀ sans ailes dans le nid. 13-III-30 (G. H. MAVROMOUSTAKIS). Je place ici cette description en