

souvenir de ma trop courte escale à Larnaca pour pouvoir chasser moi-même.

La var. *sarkissiani* FOR. me paraît voisine et doit, avec la var. *rhodium* EM. se rapporter à la sous-espèce *syriacum* EM. Celle-ci rappelle *semilaeve* ANDRÉ par la forme du thorax de la ♀ mais s'en sépare fortement par sa sculpture.

Tapinoma simrothi KRAUS. st. **phoenicium** EM.

Damas, 5-VIII, ♀ ; Byblos, ♀ ; Beyrouth, ♀.

Tapinoma israelis FOR.

Byblos, Beyrouth. Chypre : Limasol, ♀, ♀. Ces derniers sont plus foncés que le type. La ♀, outre sa petite taille, environ 5 mm., diffère de *phoenicium* par sa tête plus trapézoïdale à côtés et bord basal plus rectilignes.

Iridomyrmes humilis MAYR.

Var. : St-Maxime, 19-VII, ♀. Répandue dans les jardins. G im-
pant sur un conifère.

Acantholepis frauenfeldi MAYR v. **melas** EM.

Rhodes, 3-VIII, ♀. Les stries du thorax dont parle EMERY sont inconstantes. Jardin.

A. frauenfeldi v. **syriaca** ANDRÉ.

Byblos.

A. frauenfeldi st. **dolabella** FOR.

Izmir. Variété un peu plus petite que le type de FOREL.

Camponotus (Myrmoturba) aethiope LATR. st. **oertzeni** FOR.

Rhodes, ♀.

C. (M.) compressus F. st. **sanctus** FOR. v. **symiensis** FOR.

Izmir. Les ♀ média ont la tête plus claire que chez *sanctus* type. Isolées sur un figuier. Vallée des aqueducs.

C. (Myrmentoma) lateralis OL. v. **rhodia** EM.

Grand-Liban : Chtoura, route de Damas, 5-VII, 1 ♀. L'épinothum est horizontal dans son quart postérieur, le quart antérieur descend très obliquement. Thorax d'un brun plus ou moins rougeâtre, pour le reste comme la description de *rhodia* EM. type de Rhodes. Chez la var. *balearis* l'épinothum est plus court et plus convexe. Chez la *V. rebecae* FOR. l'épinothum n'est pas relevé devant, la couleur différente.