

haut que chez ce dernier, l'angle armé d'une dent aiguë. L'écaille ovale avec une étroite échancrure au sommet.

Fez, 350 m. (Alluaud) ♂ type. Fez (Otin), ce dernier plus fortement coloré, parfois brunâtre.

*Paratrichina longicornis* Lat.

Rabat (Otin) ♂.

*Camponotus (Myrmoturba) compressus* Fab. st. *marlensi* For.

Environs de Mogador (Alluaud) 1 ♀.

*C. (Myrmoturba) sylvaticus* Ol. st. *barbaricus* Em. v. *seroticus* Menozzi, 1922, Ann. Mus. Civ. Genova, XLIX, p. 355 ♂ ♀. Forêt des Zaers (Antoine), localité type. Demnat (de Lépiney). Rabat et Marais d'Esmir (Théry) ♂. Djebel Umsitan et Xauen (Lindberg).

*C. (M.) atlantis* For.

Ito (4-V-29) Théry ♂ < ♂ ("♂ '♂ ♀ ♂' ♀").

v. *nigrovaria* For.

Tizi, M'Tichka (de Lépiney).

*C. (M) alii* For.

Djebel Habib ♂ et Agadir, Taroudant (Théry). Andjora. Tanger, Pointe de la Malabata (Buchet, 1901) ♂. Chot el Akob (Alluaud). Vallée de Mukatall, 1800 m., 12-VI-25 (Le Cerf), 1 ♀.

*C. (M) foreli* Emery.

Ito (Théry).

v. *tingitanus* Sants.

= *C. (Myrmentoma) gestroi* v. *tingitanus* Sants. 1921. R. Soc. Espanola Hist. Nat. L, p. 13 ♂ ♀.

Oued Tigrigen 3 ♂, type, Aïn Leuh, Azrou, Ras el Ma (Théry).

*C. (Myrmentoma) lateralis* Ol. st. *balearis* Sants.

= *C. (M) lateralis spissinodis* v. *balearis* Sants. 1925 ♂.

= *C. (M) lateralis* st. *armouri* Wheeler, 1926, ♂ ♀ ♂.

La face basale de l'épinotum n'est poilue que sur son bord postérieur, ce qui en fait un vrai *lateralis*, du reste correspond très bien à la description de Wheeler.

*C. (M) piceus* Leach st. *spissinodis* For. v. *africanus* Sants (*partim*).

Tanger (Vaucher) type. Buchet, route de Marrakech (Vaucher). Kenifra, Grand Atlas, Haute Reraya (Alluaud). Azrou, Marrakech, 7-9-28 (Otin), 1 ♂. Forêt des Zaers, 1 ♂ et Aïn Leuh (Théry) ♂. Les exemplaires du Maroc ont le thorax et les pattes rouge concolore plus ou moins clair, c'est la forme type. Les exemplaires de la Tunisie ont l'épinotum nettement rembruni, ce caractère paraît constant.