

### **Brachymyrmex patagonicus** MAYR

(Fig. 1, 51, 58)

« Ann. Soc. Nat. », Modena, III, 1868, pag. 164 ♀ ♂; Emery: « Bull. Soc. Ent. Italiana », XXXVII, 1905, pag. 178 a 181, fig. 36, 41 e; Forel: « Mém. Soc. Ent. de Belgique », XX, 1912, pag. 61.

Cette espèce, le type du genre, a été bien définie par Mr. Emery, qui en avait référé à Mayr lui-même pour son identification avec le type. Très voisine de *Cordemoyi* For., elle s'en distingue par son scape plus long; sa sculpture plus luisante mais moins que chez *levis* Em. Le métanotum est réduit à une bandelette très souvent absente sur le dos, et qui dessine sur le profil une très petite encoche. Chez le type la couleur est jaune brunâtre.

Argentine: Río Negro, Patagonie (type de Strobel); Santa Cruz (Witte). Córdoba, Cabana (Scott). Alta Gracia (Bruch) ♀ ♀ ♂. Puerto Madryn (Birabén) ♀ ♂. Catamarca, Andalgalá (A. Merkle). Formosa, Nueva Pompeya (Rev. Zurflüh ♀).

Brésil, province de Sao Paulo et de Rio Janeiro.

Venezuela (d'après Forel).

Guyane anglaise (Wheeler).

#### Var. *atrátula* n. var.

(Fig. 3)

Cette variété, plutôt andicole, est plus foncée que le type, noire ou presque noire, les antennes brun clair. Lisse et luisante. Du reste comme *patagonicus*. Diffère de *B. nigricans* Sants; par sa tête moins allongée et ses articles du funicule plus longs, le scape plus foncé; de *fuscula* Em. par ses yeux plus grands et le scape plus long.

Argentine: Jujuy, Alfarcito (Debenedetti), type; Purmamarca et Puna, 4000 m. alt. (Witte); Mendoza (Carette).

### **Brachymyrmex nigricans** SANTS.

(Fig. 2)

= *Br. patagonicus* Mayr, sbsp. *Cordemoyi* For. v. *nigricans* Santschi, « Revue Suisse Zoolog. » pag. 533, 1912. = *Br. patagonicus* Mayr v. *brevicorneoides* For. 1914.

♀ 1, 5—1, 7 mm. Noir ou brunâtre. Mandibules, scape, moitié basale du funicule, articulations des pattes et tarses, roussâtres. Sculpture et pilosité à peu près comme chez *patagonicus*, un peu moins luisante.

Tête de près d'un cinquième plus longue que large. Les yeux un peu en avant du milieu des côtés et plus courts que leur distance à l'angle antérieur de la tête. Ocelles indistincts. Le scape dépasse d'un cin-