

Brachymyrmex lévis EM.

(Fig. 9, 60)

Emery: « Actes Soc. Chili », IV (1894) 1895, pag. 216, ♀. Ibid: V 1895, pag. 16, ♀ ♂ « Boll. Soc. Ent. Italiana », XXXVII, 1905, pag. 178 et 181, fig. 41 c., ♂ ♀. — Forel: « Verhand. K. K. Zool. Bot. Gesell. », Wien 1908, pag. 400, ♀ ♂.

♀ Voisine de *B. patagonicus* Mayr et *B. Cordemoyi* For. Cette espèce se distingue de la première par ses antennes plus courtes, de la deuxième par sa sculpture beaucoup plus lisse et luisante, et des deux par les yeux plus petits que le tiers des côtés de la tête. Leur diamètre égale environ la moitié de l'intervalle qui les sépare de l'angle antérieur. Thorax convexe. Pronotum large. Angles postérieurs du mésonotum arrondis en une crête mousse qui converge vers le sillon métanotal. Celui-ci est réduit à une simple suture, sans impression et n'est pas toujours visible sur le milieu du dos.

Chili: Valparaiso (types); idem (Hoffmann); Temuco, Juncal, Santiago (Silvestri).

Var. fuscula Em.

(Fig. 8)

« Boll. Soc. Ent. Italiana », 1905, pag. 178 ♀.

Aussi lisse et plus brune que le type. Les antennes sont un peu plus longues. Les yeux un peu plus grands, comme les deux tiers de l'intervalle qui les sépare de l'angle antérieur de la tête. La couleur varie du brun jaunâtre au brun foncé.

Argentine: Province de Mendoza, Punta de Vaca (Silvestri, types); idem Arroyo de la Manga (Carette).

Var. andina n. var.

Aussi lisse et luisante que le type. Noire ou noir brunâtre; le scape brun. La taille légèrement plus petite. Le scape dépasse d'environ une fois et demie son épaisseur le bord postérieur de la tête. Les yeux, plus grands, égalent l'intervalle qui les sépare de l'angle antérieur. Diffère de *Br. patagonicus* v. *atrátula* Sants. par le scape et les articles du funicule plus courts. C'est une forme alpine.

Argentine: Jujuy, Puna 4000 m. d'alt. (types); Purmamarca; cerro Azufre, 4500 m.; Territorio de los Andes (Witte).