

Brachymyrmex pictus MAYR

(Fig. 17, 55, 75)

«Verh. Zool. Bot. Ges.» Wien, XXXVII, 1887, pag. 522.

♀ Très luisant. Tête aussi longue que large; les côtés un peu convexes, et les yeux, assez grands, occupent le milieu des côtés. Pas d'ocelles. Le scape très mince dépasse de près d'un tiers de la longueur le bord postérieur de la tête.

Le funicule est également très mince, avec les articles bien plus longs qu'épais. Les sutures thoraciques très faibles; le profil du dos assez régulièrement arqué, sans traces d'impressions. Les stomates méthanotaux assez grands sont très espacés. Le reste, comme l'indique Mayr. D'après un cotype communiqué par Forel.

Brésil; Santa Catharine (Mayr, types); Pará, Manao (Mann).

Brachymyrmex australis FOREL

(Fig. 24, 48, 74)

Br. minutus For. st. *australis* Forel. «Mitt. Schweiz. Ent. Gesell.», 1901, pag. 302.

Cette forme est spécifiquement distincte de *minutus*. Le dos du thorax continu; seule la suture mésoépinothoracique un peu imprimée sur le profil. Long. 1,2-1,4 mm. Roux jaunâtre, funicule (moins le premier article), dessus de la tête et partie du gastre brunâtres; peu luisante et assez pubescente. Pilosité dressée, clairsemée, plus abondante sur le gastre; manque sur les appendices.

Tête un dixième plus longue que large; un peu rétrécie devant; les côtés convexes, le bord postérieur droit; le bord occipital concave. Yeux aussi grands que le quart des côtés de la tête et situés un peu en avant du milieu. Le scape dépasse de son épaisseur le bord postérieur. Les articles 2 à 6 du funicule sont aussi longs ou à peine plus longs que larges. Pronotum et mésonotum courts; ce dernier plus du double plus large que long. La déclivité de l'épinothorax commence tout près de la suture, en sorte que la face basale est presque nulle. Sommet de l'écaille mince et arqué.

Brésil: Santa Catharina, Pelotas, (type); Rio Grande do Sul, Sao Leopoldo, dans des termitières (Heyer).