

PHEIDOLE  
ET QUELQUES AUTRES FOURMIS NÉOTROPQUES

par le Dr F. SANTSCHI.

**Pheidole Lucretii** n. sp.

♂. — Long. 5.2 mm. Brun rougeâtre ou rouge brunâtre sombre, devant de la tête et mandibules d'un rouge plus clair. Gâstre noir. Pattes jaune brunâtre, les cuisses comme le thorax. Un réticule de grosses rides s'étend en s'atténuant de l'épistome aux angles postérieurs de la tête où les rides deviennent superficielles ; elles s'effacent presque sur le vertex et dans le sillon frontal, et le fond de leurs intervalles est presque lisse, parfois un peu rugueux ou réticulé et partout luisant. De nombreux et gros points pilifères atteignent le bord postérieur de la tête. La face occipitale reste lisse et luisante, comme le dessus et les côtés du pronotum ; le dernier a des rides transversales sur le col et forment un lâche réseau sur les côtés. Mésonotum et épinothum grossièrement rugueux-ridés en travers. La face déclive de ce dernier transversalement striée ; le sillon méso-épinothal lisse. Pédoncule et base du gâstre finement ponctués avec de grosses rugosités allongées sur le postpétiole. Reste du gâstre et appendices lisses et luisants. Du reste, en général, partout luisant. Une pilosité roussâtre très longue et abondante sur tout le corps et les appendices, plus courte sur le funicule.

Tête presque aussi large que longue (1.6 × 1.7 mm.). L'occiput faiblement échancré, les angles postérieurs arrondis, les côtés peu convexes. L'impression du vertex continuée par un large sillon frontal dans lequel se dresse une petite crête à proximité de l'aire frontale. Celle-ci lisse et bien imprimée. Arêtes frontales courtes dépassant de peu les fossettes antennaires. Epistome assez plat, sans carène, ridé devant, avec le bord antérieur un peu échancré au milieu. Mandibules lisses, luisantes, avec quelques points dans leur moitié distale, fortement striées vers leur base. Une impression longue un peu leur bord externe qui paraît relevé par une étroite crête. Le scape atteint presque le bord postérieur de la tête ; sa base arquée est aussi peu épaisse que l'autre bout. Tous les articles du funicule bien plus longs qu'épais ; la massue peu épaissie est aussi longue que les deux tiers du reste du funicule. Pronotum subsphérique, faiblement élargi de côté. Une forte impression transver-