

culés. Pas de rides sur les côtés du thorax, du reste comme la description de *Rochai*.

Chez le ♀ la tête est légèrement plus large derrière que devant. Les épines de l'épistome longues comme le tiers de leur intervalle.

Paraguay : Asuncion, Villa Morena. (D^r SPEGAZZINI). 2 ♂, 6 ♀.

***Pheidole impariceps* n. sp.**

♂. — Long. 4 mm. Jaune roussâtre, mandibules plus foncées, parfois quelques ombres sur le mésonotum. Appendices et gastre jaune un peu brunâtre. Bords de l'épistome et des mandibules, postpétiole et bout du gastre plus ou moins brunâtres. Luisante. Trois rides parallèles partent du côté interne de chaque arête frontale et s'arrêtent au milieu de la tête. Joues et espace entre les yeux et les fosses antennaires grossièrement ridés en long avec quelques trabécules. Mésopleure et côtés de l'épinotum réticulés, rugueux. Face basale de ce dernier transversalement striée et faiblement réticulée. Le reste lisse avec des points pilifères. Pilosité dressée oblique, jaunâtre, assez abondante sur le corps et les appendices, plus longue sur le gastre qui manque de pubescence.

Tête rectangulaire, distinctement plus longue que large (1.5 × 1.3 mm.). Ses côtés un peu convexes avec les yeux à leur tiers antérieur. Le bord postérieur a une échancrure dans son tiers moyen, profonde d'un tiers à la moitié de sa largeur et qui se continue avec un sillon frontal complet. Aire frontale triangulaire, plus longue que large. Épistome transversalement imprimé derrière sa forte échancrure antérieure, lisse, avec parfois, une trace de ride médiane. Mandibules lisses avec quelques points, le bord terminal fortement bidenté au bout, le reste nettement denticulé et un peu concave. Les scapes, arqués à la base, un peu épais dans leur moitié distale, atteignent presque le 8^e postérieur de la tête. La massue bien plus épaisse que le reste du funicule dont les articles sont tous plus longs qu'épais. — Pronotum arrondi, sans bosse appréciable. La moitié postérieure du mésonotum forme un bourrelet épais descendant en arrière dans le sillon métanotal. La moitié antérieure largement concave. Face basale de l'épinotum rétrécie devant ses bords très arrondis, un peu concave entre les épines dentiformes et longues comme le tiers ou le quart de leur intervalle. Face déclive un peu plus courte que la précédente. Sommet du nœud du pétiole transversal et faiblement échancré, le plan antérieur peu concave. Le postpétiole environ de moitié plus large que long et que le nœud précédent.

♀. — Long. 2.5 mm. Tête noire, reste du corps jaune roussâtre