

comme le ♀. Deux rides autour des fosses antennaires et devant les yeux ; mésopleure et épinothum ponctués-réticulés ; tout le reste lisse et très luisant.

Tête environ un cinquième plus longue que large, les côtés convexes, le bord postérieur transversal ou faiblement convexe avec les angles fortement arrondis mais distincts. Yeux entre le milieu et le tiers antérieur des côtés. Sillon frontal effacé. Epistome lisse, convexe, à peine échan-crée devant. Les scapes dépassent le bord postérieur de la tête des deux cinquièmes de leur longueur. Bourrelet du mésonotum moins haut que large en avant duquel le promésonotum forme une courbe régulière sur le profil. Face basale de l'épinothum plus nettement bordée que chez le ♀. Les dents longues comme le quart environ de leur intervalle. Le pétiote est longuement pédiculé avec un nœud assez bas. Le post-pétiote à peine un quart plus large que le pétiote. Pattes médiocrement enflées, le fémur postérieur dépasse un peu le milieu du gastre.

Brésil : Sao Paulo, Ile Alcatrazas. (LUEDERWALDT).

Diffère de *Ph. laevifrons* MAYR par son mésonotum saillant. La couleur de la tête des ♀ est caractéristique.

Pheidole impariceps SANTS. v. **fusciclava** n. var.

♀. — La tête est moins longue que chez le type, presque aussi large que longue, les joues plus fortement réticulées, ridées.

♂. — La massue antennaire est rembrunie (pas chez le ♀ ni chez la ♀ type) la tête d'un noir plus brunâtre, le pronotum plus terne.

♂. — Long. 4.6 mm. Jaune terne. Tête noir brunâtre, trois taches sur le mésonotum, un peu l'épinothum et la moitié postérieure du gastre jaune brunâtre. Lisse et luisant, sauf les parties claires du mésonotum qui sont finement sculptées et les deux tiers antérieurs de la tête ridés-réticulés. Pilosité comme chez le ♀. Ailes hyalines à nervures jaunes. Tête en triangle isocèle, arrondie aux angles en y comprenant les yeux qui occupent entièrement les deux tiers antérieurs des côtés. Ocelles plus grands que leurs intervalles, le médian surélevé et aussi large que la longueur du scape. Deuxième article de l'antenne globuleux, aussi long que le quatrième ; le troisième un peu plus court ; le dernier aminci et le double plus long que le deuxième. Mandibules bidentées, l'apicale très aiguë. Pronotum non dépassé par le mésonotum. Angle de l'épinothum mousse mais net.

Brésil : Etat de Sao Paulo, Ile Alcatrazas. (LUEDERWALDT).

Le ♀ se rapporte un peu à *Ph. angusta* FOR. mais la ♀ est bien distincte.