

Pheidole Reichenspergeri n. sp.

♂. — Long. 3.8-4 mm. Voisine de *angusta* FOR. *rufipilis* FOR. et *peregrina* WHEELER. Brun rouge foncé. Mandibules, joues, antennes, pattes, côté du mésopleure et sillon métanotal roux brunâtre. Luisante. Une ride prolonge les arêtes frontales jusqu'au milieu de la tête environ et, en dedans de laquelle se voient trois à quatre fragments de rides plus courtes laissant le reste du front lisse. Quelques rides semblables espacées sur les joues et en arc autour des fosses antennaires. Tout le reste de la tête lisse et très luisant avec de petits points pilifères. Dos du thorax irrégulièrement ridé en travers. Mésopleure, côtés de l'épinothum et pédoncule irrégulièrement ridés-rugueux avec un fond finement ponctué sur tout le thorax sauf le milieu du dos et les côtés du pronotum qui sont lisses et luisants comme le gastre. Pilosité dressée jaune claire, abondante et surtout très longue, aussi bien sur la tête et les appendices que sur le reste du corps où certains poils sont aussi longs que la hauteur du thorax.

Tête plus longue que large (1.25×1.1 mm.) également rétrécie devant et derrière, avec les côtés assez convexes, le bord postérieur faiblement et largement concave avec un fort sillon sur le vertex qui ne se prolonge pas sur le front. Aire frontale un peu plus large que longue. Epistome lisse, faiblement concave de droite à gauche et convexe de haut en bas, le bord antérieur largement mais peu profondément échanuré. Mandibules lisses avec quelques rides à la base. Le bord terminal tranchant avec deux fortes dents terminales. Le scape, mince et arqué à la base, atteint ou atteint presque le bord postérieur de la tête. Articles du funicule plus longs qu'épais, la massue plus courte que le reste. Pronotum arrondi, faiblement tuberculé aux angles. Mésonotum avec bourrelet et sillon transversaux développés (plus que chez *rufipilis*). Le sillon métanotal assez profond et large. Les deux faces épinothales subégales, la basale un peu convexe sur le profil, plus longue que large, creusée en gouttière avec les bords émoussés mais distincts. Epines bien divergentes, plus longues que larges à la base et aussi longues que la moitié de leur intervalle. Nœud du pétiole aussi haut que long, à la base le sommet mince et entier. Postpétiole aussi large au quart antérieur que long et de moitié plus large que le pétiole. Base du gastre arrondie.

♀. — Long. 2.8 mm. Tête, dessus et côtés du pronotum, gastre et appendices lisses sauf quelques rides autour des fosses antennaires. Tiers postérieur du pronotum, son col, reste du thorax et pédoncule réticulés-ponctués.