

bord postérieur des deux cinquièmes seulement. La face basale de l'épinotum plus longue a une gouttière longitudinale plus marquée. Le sommet du premier nœud moins émoussé. La réticulation de l'épinotum plus faible. Le reste lisse et luisant. Brun foncé ; tête noire. Articulations des appendices et mandibules jaune brunâtre. D'ailleurs comme chez *longiscapa* FOR.

Brésil: Santa Catharina, Blumenau. (REICHENSBERGER leg.) 1 ♀ 1 ♂.

Pheidole Wolfringi FOR.

Brésil. Etat de Rio (REICHENSBERGER leg.) ♂. ♀.

Pheidole Wolfringi FOR. st. **Durionei** n. st.

♂. — Long. 4.5-4.8. Brun rougeâtre, funicule et pattes brun jaunâtre, gastre brun roussâtre.

Tête plus finement et densément ponctuée-réticulée que chez le type, et mate, sauf vers les lobes occipitaux où la sculpture est un peu plus faible et un peu luisante mais bien moins que chez le type. Les rides du devant et des côtés de la tête un peu moins fortes. Les côtés de la tête sont en outre plus richement parsemés de gros points. Le pronotum est luisant et en partie lisse dessus (très mat et sculpté chez le type). Les mandibules plus fortement striées à la base. Le pronotum à peine plus arrondi. Pour le reste, forme de la tête, longueur des antennes etc., comme chez *Wolfringi*.

♀. — Long. 3 mm. Thorax et pédicule brun rouge clair, rembrunis sur le dos. Dessus de la tête, gastre brun noirâtre. Mandibules et tarsi jaunes ; reste des appendices et dessous de la tête jaune brunâtre. Tête, pronotum et gastre lisses et luisants. Beaucoup plus ténue que le type. L'épistome inerme, la face basale indistinctement bordée ; pour le reste comme chez le type.

Argentine : Cordoba. Tanti Viejo (DJRIONE).

Pheidole vafra n. sp.

♂. — Long. 3.5 mm. Voisin de *angusta* FOR. et de *peregrina* WHEEL. Brun rouge. Mandibules jaunes, antennes, articulations des pattes jaune brunâtre. Gastre brun. Lisse et luisante. Des rides irrégulièrement sinueuses et éparsément anastomosées sur les joues et entre les arêtes frontales et les yeux. Deux ou trois rides sur le versant interne des arêtes frontales et ne dépassant qu'à peine le niveau des yeux. Mésonotum et épinothum finement réticulés-ponctués, submats, avec