

quelques fines rides transversales sur la face basale de ce dernier. Pilosité roussâtre, fine, assez abondante et longue surtout sur le gastre qui n'a pas de pubescence (mais de moitié moins longue que chez *Ph. Reichenspergeri*). Appendices amplement garnis de poils obliques.

Tête petite, rectangulaire, à peine plus longue que large ( $1 \times 1,1$  mm.). Les côtés faiblement convexes, le bord postérieur peu profondément échancré avec un fort sillon sur le vertex qui se continue, affaibli, jusqu'à l'aire frontale. Celle-ci très imprimée, plus longue que large et lisse. Yeux au tiers antérieur des côtés. Epistome lisse, peu convexe, sans carène, avec une impression étroite longeant le bord antérieur qui est médiocrement échancré au milieu. Mandibules lisses, le bord terminal aussi large que le tiers de la longueur de la tête, armées de deux fortes dents apicales et de deux petites dents vers l'angle interne, le reste faiblement denticulé. Scape mince et arqué à la base et près d'atteindre le bord postérieur, il s'en faut de deux fois son épaisseur environ. Tous les articles du funicule plus longs qu'épais. Le dernier peu plus long que le précédent. Deux épines arquées en avant, bien développées, se voient sous l'insertion des mandibules. Pronotum bien plus étroit que la tête, les épaules très arrondies et peu saillantes, le tubercule pas ou à peine indiqué. L'échancrure que dessine sur le profil le sillon transversal du mésonotum n'est que d'un quart moins profond que l'échancrure métanotale. Le bourrelet du mésonotum arrondi, ses faces antérieure et postérieure subégales. La face basale de l'épinotum plus longue que large derrière, rétrécie devant les côtés en bordure mousse limitant une gouttière médiane. Les angles n'ont que de petites dents mais leur large intervalle est profondément concave. Nœud du pétiole relativement petit, moins haut au dessus de son pédicule que la hauteur de ce dernier. Sa face postérieure presque verticale, le sommet très arrondi. Postpétiole à côtés assez arrondis, un quart plus large que long et la moitié plus large que le pétiole. Gastre tronqué à la base ; les fémurs postérieurs en dépassent un peu le milieu.

♀. — Long. 2. 2 mm. Brun rouge foncé, presque noirâtre dessus, plus clair sur les côtés. Gastre et tête noirâtres. Mandibules, condyles des scapes et tarsi jaune terne. Milieu des cuisses et des tibias brun foncé comme les antennes. Lisse et luisant. Mésonotum et épinotum densément réticulés-punctués et mats. Tête d'environ un cinquième plus longue que large, longuement arrondie derrière les yeux, le bord postérieur très convexe et distinct du bord cervical. Les yeux au milieu des côtés. Un léger et court sillon frontal. Epistome sans échancrure, avec la même impression que chez le ♂. Mandibules dentées, les deux dents