

apicales très fortes. Leur bord externe presque droit jusqu'au quart terminal. Le scape, plus mince et plus long que chez les variétés *Dione* et *laevinota* FOR. de *Ph. rufipilis* FOR., dépasse d'environ un tiers le bord postérieur de la tête. Sillon mésonotal plus échancré que chez *Dione*, la face basale un peu plus étroite et les dents aussi petites. Le pédoncule lisse dessus.

Brésil : Santa Catharina, Blumenau (A. REICHENSBERGER leg.).

Diffère de *Ph. rufipilis* FOR. par sa pilosité plus courte, sa sculpture plus lisse ; et de *Ph. peregrina* WHEEL. par l'absence de carène à l'épistome, les deux premiers articles de la massue plus longs.

***Pheidole idiota* n. sp.**

Très voisine d'aspect de *P. vafra*, mais spécifiquement distincte.

♂. — Long. 4 mm. Roux brunâtre clair. Antennes moins le bout, dessus du thorax, milieu des cuisses et des tibias et l'abdomen brun moyen. La base du gastre un peu éclaircie. Encore plus faiblement sculptée que chez *Ph. vafra* SANTS. Les rides des joues ne se prolongent pas au-delà des fosses antennaires et le mésonotum est lisse dessus. La face basale de l'épinothum, lisse au milieu, n'a que quelques courtes rides transversales. Excepté le mésopleure et les côtés de l'épinothum, tout est lisse et luisant. Pilosité un peu plus longue que chez *Ph. vafra*, presque aussi abondante que chez *Dione*.

Tête presque carrée (1.1 × 1.2 mm.), les côtés droits, le bord postérieur à peine échancré avec les angles sensibles mais arrondis. Le sillon frontal atteint l'occiput. Aire frontale peu imprimée, distincte. Épistome lisse, presque plat, à peine convexe au milieu, sans carène et assez profondément échancré devant. Mandibules lisses avec quelques stries et une impression à la base ; leur bord terminal, presque aussi long que les deux cinquièmes de la tête, est concave avec deux fortes dents apicales et deux plus petites à l'angle interne. Le scape est plus épais que chez *vafra*, mat (lisse chez *vafra*), plus brusquement coudé à la base où il est sensiblement comprimé (cylindrique chez *vafra*). Petits articles du funicule à peine plus longs qu'épais. Le dernier article de la massue est environ la moitié plus long que le précédent. Thorax comme chez *vafra* mais un peu plus large, le sillon promésonotal un peu moins profond. La face basale de l'épinothum moins profondément creusée. Les dents aussi petites, comme le quart de leur intervalle. Le nœud est aussi haut que la hauteur du pédicule sous-jacent. Postpétiole un peu anguleux au tiers antérieur des côtés, moitié plus large que long ; du reste comme *vafra*.