

♂. — Long. 2.2 mm. Brun de poix assez foncé, les côtés du thorax et appendices plus clairs. Tarses et mandibules jaunes. Tête d'un quart à un cinquième plus longue que large, les angles arrondis avec le bord postérieur distinct. Antennes encore plus sveltes que chez *vafra*, la pubescence plus couchée; le scape dépasse le bord postérieur de leur tête des deux cinquièmes; il est faiblement arqué à sa base. Face basale de l'épinotum un peu plus étroite. Le nœud du pétiole relativement un peu plus haut; du reste comme chez *vafra* avec la même sculpture.

♀. — Long. 6 mm. Tête sauf la face occipitale, deux bandes convergentes en arrière sur le mésonotum, épinotum, les deux nœuds et la base du gastre réticulés ponctués avec des rides longitudinales; mat. Le front et le reste lisse et luisant, avec des points pilifères épars et fins. Pilosité comme chez le ♂, mais plus oblique sur le gastre.

Tête trapézoïdale avec un bord postérieur droit, plus large d'un cinquième que le bord antérieur. Les yeux occupent un peu plus d'un tiers des côtés et sont distants du bord antérieur d'au moins la moitié de leur grand diamètre. Le scape dépasse légèrement le bord postérieur. Epistome et mandibules comme chez le ♂ avec la même impression à la base de celles-ci. Mésonotum imprimé dans le champ sculpté. Epinotum fortement concave entre les dents qui sont plus développées que chez le ♂ et longue, comme le sixième de leur large intervalle. Postpétiole le double plus large que long. Ailes hyalines à nervures jaune brunâtre. Gastre de la ♀ vierge court.

Argentine : Cordoba, Alta Gracia (C. BRUCH).

Beaucoup plus svelte que *Ph. Seeldrayeri* FOR. Remarquable par la petite tête et les grandes mandibules du ♂ ainsi que par l'impression de leur base.

***Pheidole defecta* n. sp.**

♂. — Long. 3.6 mm. Voisine de *dentata* et *bicarinata* MAYR. Jaune un peu ambré. Gastre jaune plus terne. Mandibules roussâtres, leur bord terminal et celui de l'épistome brunâtre. Luisante. Lisse. Des rides longitudinales parallèles, espacées, occupent la moitié antérieure de la tête avec quelques réticules entre les yeux et les fosses antennaires où les rides ne sont pas arquées. Quelques rides également sur les côtés de l'épinotum, le dessus très finement réticulé et assez luisant. Pilosité dressée assez courte, rare sur le thorax, oblique en arrière sur l'abdomen et sur les appendices.

Tête rectangulaire, environ un cinquième plus longue que large, les