

côtés à peu près droits jusqu'au quart postérieur où ils s'arrondissent en rentrant. Echancre occipitale moyenne, concave, se continuant avec le sillon frontal. Celui-ci plus fortement imprimé au milieu du front comme l'aire frontale. Les arêtes courtes mais prolongées par une ride jusqu'au milieu de la tête. Aire du scape indiquée par l'absence d'une ride. Epistome lisse au milieu avec une courte carène, les côtés striés, le bord antérieur indistinctement échancré (nettement échancré chez *dentata* et *bicarinata* MAYR.). Mandibules lisses avec des points épars et quelques stries à la base. Le scape dépasse à peine le tiers postérieur de la tête. Les articles du funicule plus longs que larges. Massue assez épaisse, le dernier article un tiers plus long que le précédent. Pronotum arrondi, presque pas élargi aux épaules. Mésonotum sans impressions ni bourrelet transversaux, sa face déclive très courte. Face basale de l'épinothorax fortement bordée, comme chez *bicarinata*, creusée en gouttière, pas sensiblement plus longue que la face déclive avec laquelle elle fait un angle très ouvert. Les dents longues comme le tiers de la face basale. Pédicule du pétiole pas beaucoup plus long que la hauteur du nœud. Postpétiole de moitié plus large que long, les côtés en cône mousse. Pattes courtes.

Guatemala : (1 ♂ reçu de M. FOREL sous le nom de *Ph. susannæ*).

C'est peut-être une race de *bicarinata*, mais sa tête est plus allongée et la pilosité plus discrète.

***Pheidole triconstricta* FOR. var. *rosariensis* FOR.**

Deux ouvrières memmitergates. Aussi grandes que le soldat dont elles ont le thorax, mais la tête ressemble à celle de l'ouvrière ordinaire, quoique un peu plus grande. Mate, les côtés plus accentués, un peu plus large que longue. Le gastre distendu habité par un Nématode (Mermis).

Argentine : Cordoba, Alta Gracia et La Granja (BRUCH). Tucuman, Famaillo (WEISER).

Variété moins ponctuée que chez *rosariensis* FOR. mais plus luisante que la var. *nubila* EM. ; du reste aussi foncée.

***Pheidole triconstricta* FOR. var. *hebe* n. var.**

♂. — Long. 4 mm. Sculpture de la tête aussi étendue que chez la var. *nubila* EM., mais roussâtre comme le type de l'espèce. La tête est plus étroite, le scape dépasse le milieu de la distance de l'œil à l'angle postérieur.