

Pheidole Hetschkoi MAYN. var. **frivola** n. var.

Rouge jaunâtre, les mandibules rouge foncé. Antennes et pattes jaune à peine brunâtre. Gastre jaune brunâtre. Pour le reste comme la description du type.

Brésil : Blumenau (MÜLLER) ♀ ♂.

Cette espèce est très voisine de la précédente.

Pheidole æquiseta n. sp.

♀. — Long. 3.5 mm. Roux testacé. Mandibules, hanches, tarses et gastre jaunâtres, ce dernier un peu rembruni au milieu. Densément et régulièrement réticulée-punctuée, mate. Bord terminal des mandibules, une étroite bande frontale et gastre lisses et luisants. Le reste des mandibules finement strié en long. En outre, quelques rides sur les joues. Une pilosité dressée jaunâtre, obtuse, assez courte et uniformément répartie sur le corps et les appendices, à peine plus longue sur la tête.

Tête d'un quart à un tiers plus longue que large. Les côtés, moins convexes que chez *Ph. Bergi*, fuyants à partir des yeux vers un bord cervical étroit et marqué d'une arête dentée latéralement. Les yeux convexes, placés entre le tiers antérieur et le milieu des côtés. Epistome convexe, à bord antérieur entier, non caréné ; parfois quelques mailles de faibles rides. Arêtes frontales ne dépassant pas le niveau du bord postérieur de l'aire frontale, laquelle est bien imprimée devant. Le scape dépasse les yeux des deux tiers de sa longueur environ. Tous les articles du funicule sont, pour le moins, le double plus longs qu'épais. Les deux premiers articles de la massue subégaux, environ 4 à 5 fois plus longs qu'épais, le dernier un peu plus long. Thorax très allongé. Pronotum bien plus long que large (avec son col), sans trace de bosses ni tubercules, et régulièrement convexe d'avant en arrière. Le mésonotum a une impression plus marquée mais plus arrondie que chez *Ph. Bergi* MAYR. La face basale de l'épinotum est environ deux fois et demie plus longue que la déclive, faiblement convexe, non bordée sauf une ride en arrière vers les angles qui sont inermes ou subdentés. Le pétiole est un peu plus long que chez *Bergi* avec un nœud un peu plus bas. Le postpétiole aussi large que chez cette espèce mais plus long.

Bolivie : San José, a deux lieux au N. du chemin de Corumba (LIZER et DELÉTANG).

Voisine de *Ph. Walacei* MANN., mais bien plus petite.