

Pheidole fallax MAYR st. **Emilioe** FOR.

Brésil : Minas Geraes, Pirocicabo (E. LUJA) ♂ ♀.

Bolivie : Izozo (LIZER et DELÉTANG), font passage à la var. *retifera* EM. — Argentine : Cordoba, Cabana (SCOTT) ; idem : Unquilla (BIRABEN).

Pheidole obtusopilosa MAYR.

Argentine : Cordoba, Tantiviego (DURIONE), Tucuman (D^r CARETTE). Les exemplaires de cette dernière localité sont plus foncés que le type, la tête est plus noirâtre.

Pheidole obtusopilosa MAYR st. **heterothrix** n. st.

♀. — Long. 3 mm. Rouge ferrugineux. Mandibules, massue, post-pétiole d'un rouge plus foncé. Gastre brun foncé, plus rouge à la base. Reste des appendices jaune-brunâtre. Appendices et gastre luisants et lisses, le reste mat, densément réticulé-ponctué. De grosses rides longitudinales, un peu serpigineuses, plus ou moins interrompues et anastomosées, couvrent toute la face supérieure et les côtés de la tête jusqu'à l'occiput où elles forment un large réticulum. Quelques grosses fossettes sur la face cervicale. Pronotum réticulé comme l'occiput. Tête, thorax et appendices parsemés de poils assez courts, épais et tronqués. Abdomen plus richement garni de poils plus longs et pointus.

Tête rectangulaire, 1/5 à 1/4 plus longue que large, les côtés un peu convexes (moins que chez *obtusopilosa*), pas distinctement plus étroite devant que derrière. Scrobe superficiel, mais aire du scape distincte, réticulée, atteignant le milieu de la tête. Le sillon frontal, d'abord peu profond, le devient d'autant plus qu'il se rapproche de l'occiput. Vertex peu ou pas imprimé. Aire frontale luisante, enfoncée. Epistome ridé en long, la ride médiane plus forte. Mandibules avec quelques grosses stries sur leur face externe. L'extrémité du scape plus rapprochée de l'œil que de l'angle postérieur de la tête. Articles 2. à 5. du funicule plus épais que longs, les 6. à 8. un peu plus longs. Pronotum convexe épaulé, mais bien moins que chez *obtusopilosa*. Carène transversale du mésonotum développée. Epines un peu plus longues que la moitié de la face basale, divergentes et mousses au bout. Sommet du pétiole aminci, peu ou pas échancré. Postpétiole le double plus large que long et que le pétiole ; les côtés côniques au tiers antérieur y proéminent plus que chez *obtusopilosa*.

♂. — Long. 2 mm. Tête et gastre noirâtres, le reste rouge ferru-