

Pheidole flavens ROG. st. **alacris** n. st.

♂. — Long. 3 mm. Noir ou rouge sombre avec des parties du thorax noires. Gstre d'un brun marron. Funicule et pattes jaune brunâtre. Tête assez densément striée-ridée en long jusqu'au bord postérieur. Dix-sept à dix-huit rides entre les arêtes frontales au niveau des yeux. Les interrises sont densément et finement réticulés-punctués et subopaques sauf vers le bord postérieur de la tête qui est plus luisant. La face postérieure sans ride, luisante. Les côtés ridés sculptés comme le dessus. Six rides entre l'œil et l'aire du scape laquelle est finement punctuée réticulée, assez mate comme, du reste le, fond de la sculpture du thorax et sur laquelle s'ajoutent quelques rides irrégulièrement et esparsément anastomosées. Un léger espace luisant sur le dos du pronotum. Postpétiole, gstre, épistome et mandibules lisses et luisants. Pétiole très finement punctué. Pilosité assez longue, très fine et passablement abondante, bien plus courte et oblique sur les pattes.

Tête assez convexe latéralement, mais moins large que chez *rudigenis* EM. Le sillon frontal non imprimé. Aire frontale prolongée. Une assez forte impression sur le vertex. Quelques faibles stries sur les côtés de l'épistome qui n'a ni carène ni échancrure. Quelques rides sur la face externe des mandibules et des points épars au dessus. Le scape dépasse à peine le milieu de l'intervalle entre l'œil et l'angle postérieur de la tête. Articles 2. à 7. du funicule à peine plus épais que longs. Pronotum faiblement tuberculé aux épaules, le dessus du promésonotum assez déprimé. Pas de carène transversale sur le mésonotum ou une légère indication par la sculpture. Sillon métanotal peu marqué. La face déclive du mésonotum courte et peu prononcée. Face basale de l'épinotum fortement bordée et très concave de droite à gauche. Les épines aiguës ont une forte base comprimée et ne paraissent pas plus hautes, sur le profil, que la moitié de la longueur de la face basale. Scmnet du pétiole assez mousse, non échancré. Postpétiole luisant, deux tiers plus large que long et que le pétiole, les côtés en cônes obtus.

♀. — Long. 1.9-2 mm. Un peu plus clair que le ♂. Entièrement réticulée-punctuée, mate, sauf le postpétiole, le gstre et les appendices qui sont lisses et luisants. Epistome faiblement striolé. Le scape dépasse le bord postérieur de la longueur du premier article du funicule. Dessus du promésonotum convexe. Face basale de l'épinotum carrée, bordée, les épines redressées et longues comme le quart des côtés ou moins. Nœud du postpétiole triangulaire. Postpétiole un peu plus large, les