

che, ses angles postérieurs légèrement lobés. Mésonotum limité devant par un faible sillon arqué, son tiers moyen creusé en gouttière transversale que limitent des crêtes ridées, (la postérieure plus marquée), et que suit une face déclive jusqu'au large sillon métanotal. Face basale de l'épinotum bordée, rectangulaire, un peu plus longue que, large séparée de la face déclive par une crête transversale. Epines aussi longues que les trois quarts de la face basale. Pédicule du pétiole un quart plus long que la hauteur du nœud considéré jusqu'à la face inférieure de l'article. Le sommet tronqué, à peine plus large que le pédicule. Postpétiole environ un tiers plus large que le pétiole, les côtés arrondis. Gastre déprimé. Cuisses très enflées dans leur moitié distale.

Argentine : Cordoba, Alta Gracia (C. BRUCH. col. et leg.).

Cette espèce, dont il n'a été récolté que deux exemplaires, est assez embarrassante ; elle a des affinités avec le genre *Tetramorium* (sculpture, pétiole) mais le thorax rappelle celui de *Ph. distorta* FOREL par sa forme. La découverte des autres castes tranchera la question.

Pheidole (Elasmopheidole) aberrans MAYR. var. **minensis** n. var.

♂. — 5.5-6 mm. Rouge testacé. Gastre et pattes jaunâtres. La tête est plus densément striée que le type, et les stries s'étendent sur la face occipitale et les côtés sans espaces lisses. La tête est en outre plus longue et ses côtés plus parallèles. Le promésonotum dessine sur le profil une courbe beaucoup plus accentuée.

♀. — Long. 10-10.5 mm. Noire. Gastre et pattes brun jaunâtre. Mandibules et épistome rouge sombre. Diffère de la ♀ type par sa tête plus longue à côtés plus parallèles et à stries plus généralisées et plus fortes. Le mésonotum ne dépasse pas le pronotum mais descend verticalement. Face déclive de l'épinotum plus concave en haut avec les dents plus fortes. Le pétiole a un nœud beaucoup plus haut. Ailes un peu plus foncées. Plus robuste mais pour le reste semblable au type.

Brésil : Minas Geraes, Pirapara (E. GARBE) ♀ ♀ ♂.

Pheidole (Elasmopheidole) aberrans MAYR. st. **Weiseri** n. st.

♂. — Long. 5.2-6.2 mm. Thorax et cuisses d'un brun châtain. Gastre et pattes brun jaunâtre. Tête jaune rougeâtre avec le bord des crêtes frontales et de l'épistome brun noirâtre. Beaucoup moins sculptée que le type, les stries sont faibles et ne dépassent pas le milieu de la tête dont la partie postérieure est lisse, luisante avec de gros points épars. La ride