

autres espèces. Le dessus du thorax estompé de brun jaunâtre et le tiers postérieur du gastre assez fortement rembruni. Ailes foncées.

Guyane française : Nouveaux Chantiers (LE MOULT).

Carebara incerta n. sp.

♂. — Long. 10 mm. D'un jaune roussâtre à peine plus clair que chez *bicarinata* SANTS. plus foncé que chez *Winifredae* WHEELER. Deux taches floues de chaque côté du mésonotum. Vertex noirâtre. Ailes jaunâtres à nervures roussâtres, la supérieure longue de 9.8 mm. Sculpture comme chez *bicarinata*, le dessus du thorax peu luisant, la tête mate, le reste du corps luisant. Scape conique, plus mince à la base (plutôt ovoïde chez *bicarinata*), long comme les deux tiers du deuxième article du funicule. La longue dent apicale des mandibules est immédiatement suivie de trois denticules laissant le tiers restant du bord terminal inerme et arrondi à l'angle interne. La partie médiane saillante du clypeus relativement plus étroite que chez *bicarinata*. Le thorax est plus convexe devant que chez cette dernière espèce et le postpétiole a une impression marquée comme chez *Winifredae*. Pour le reste comme chez *bicarinata*, mais plus robuste.

Brésil ; Goya. (BAER J. de GAULLE). 1 ♂.

C'est peut-être le ♂ de *Carebara anophthalma* EM.

Apterostigma Luederwaldti n. sp.

♀. — Long. 3.7 mm. Brun noirâtre. Mandibules, bout de l'antenne et pattes roussâtres, reste de l'antenne et hanches brun roussâtre. Mate. Lisse, d'un aspect feutré, avec des îlots de petits tubercules peu élevés, plus ou moins confluent ou réunis par des trabécules (comme chez *A. Bruchi* SANTS. mais les tubercules sont encore plus petits). Pilosité redressée fine, abondante comme chez *A. Wasmanni* FOR.

Tête sans col, mais un simple rebord filiforme comme chez *A. Steigeri* SANTS. La tête est plus rétrécie derrière que chez cette espèce. Le milieu du bord postérieur présente une légère échancrure due à une impression longitudinale qui atteint le vertex et dans laquelle la sculpture est presque entièrement lisse et glabre. Le front est aussi largement imprimé au niveau des yeux avec une sculpture plus faible. Les côtés de cette impression sont formés par des crêtes moins mousses, que chez *A. discrepans* FOR. qui limitent en dedans un scrobe peu profond, atteignant le tiers postérieur de la tête. Il est bordé en dehors par une arête passant en dedans des yeux et qui va se réunir en arrière avec la précé-